

Ю.Н. Медведев



ХИМИЯ




ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

10 вариантов заданий
Ответы и решения
Критерии оценок
Бланки ответов

2010

Допущено
ФИПИ



ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН

Ю.Н. Медведев

ХИМИЯ

ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

*Допущено Федеральным институтом педагогических измерений
к использованию в образовательных учреждениях
Российской Федерации в качестве сборника тестовых заданий
для подготовки к единому государственному экзамену по химии*

10 вариантов заданий

Ответы и решения

Критерии оценок

Бланки ответов

**Издательство
«ЭКЗАМЕН»**

**МОСКВА
2010**

УДК 373:54(075.3)
ББК 24я72
М42

Медведев, Ю.Н.

М42 ЕГЭ 2010. Химия. Типовые тестовые задания / Ю.Н. Медведев. — М.: Издательство «Экзамен», 2010. — 111, [1] с. (Серия «ЕГЭ 2010. Типовые тестовые задания»)

ISBN 978-5-377-02971-7

Типовые тестовые задания по химии содержат 10 вариантов комплектов заданий, составленных с учетом всех особенностей и требований Единого государственного экзамена в 2010 году. Назначение пособия — предоставить читателям информацию о структуре и содержании КИМ 2010 г. по химии, степени трудности заданий.

В сборнике даны ответы на все варианты тестов и приводятся решения всех заданий одного из вариантов. Кроме того, приведены образцы бланков, используемых на ЕГЭ для записи ответов и решений.

Автор заданий — ведущий ученый, преподаватель и методист, принимающий непосредственное участие в разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ.

Пособие предназначено учителям для подготовки учащихся к экзамену по химии (не только к единому, но и к традиционному письменному), а учащимся-старшеклассникам и абитуриентам — для самоподготовки и самоконтроля.

УДК 373:54(075.3)
ББК 24я72

Формат 60×90/8. Гарнитура «Таймс». Бумага газетная.
Уч.-изд. л. 3,12. Усл. печ. л. 14. Тираж 30 000 экз. Заказ №

ISBN 978-5-377-02971-7

© Медведев Ю.Н., 2010
© Издательство «ЭКЗАМЕН», 2010

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|----------------------------------|----|
| Предисловие | 4 |
| ВАРИАНТ 1..... | 9 |
| Часть 1 | 9 |
| Часть 2 | 13 |
| Часть 3 | 15 |
| ВАРИАНТ 2..... | 17 |
| Часть 1 | 17 |
| Часть 3 | 24 |
| ВАРИАНТ 3..... | 25 |
| Часть 1 | 25 |
| Часть 2 | 29 |
| Часть 3 | 32 |
| ВАРИАНТ 4..... | 33 |
| Часть 1 | 33 |
| Часть 2 | 37 |
| Часть 3 | 40 |
| ВАРИАНТ 5..... | 41 |
| Часть 1 | 41 |
| Часть 2 | 45 |
| Часть 3 | 47 |
| ВАРИАНТ 6..... | 49 |
| Часть 1 | 49 |
| Часть 2 | 52 |
| Часть 3 | 55 |
| ВАРИАНТ 7..... | 56 |
| Часть 1 | 56 |
| Часть 2 | 59 |
| Часть 3 | 62 |
| ВАРИАНТ 8..... | 63 |
| Часть 1 | 63 |
| Часть 2 | 67 |
| Часть 3 | 69 |
| ВАРИАНТ 9..... | 71 |
| Часть 1 | 71 |
| Часть 2 | 75 |
| Часть 3 | 78 |
| ВАРИАНТ 10 | 79 |
| Часть 1 | 79 |
| Часть 2 | 83 |
| Часть 3 | 86 |
| ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ..... | 87 |
| Решения заданий варианта 1 | 96 |

ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые выпускники и абитуриенты!

Настоящее учебное пособие представляет собой сборник заданий для подготовки к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии, который является как выпускным экзаменом за курс средней школы, так и вступительным экзаменом в вуз. Структура пособия отражает современные требования к процедуре сдачи ЕГЭ по химии, что позволит вам лучше подготовиться к новым формам выпускной аттестации и к поступлению в вузы.

Пособие состоит из 10 вариантов заданий, которые по форме и содержанию приближены к демоверсии ЕГЭ и не выходят за рамки содержания курса химии, нормативно определенного следующими документами:

- 1) Обязательным минимумом содержания основного общего образования по химии (приказ Минобробразования № 1236 от 19.05.1998 г.),
- 2) Обязательным минимумом содержания среднего (полного) общего образования по химии (приказ Минобробразования № 56 от 30.06.1999 г.),
- 3) Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования. Химия (приказ Минобробразования № 1089 от 05.03.2004 г.).

Уровень предъявления содержания учебного материала в заданиях соотнесен с требованиями государственного стандарта к подготовке выпускников средней (полной) школы по химии.

В контрольных измерительных материалах Единого государственного экзамена используются задания трех типов:

- задания базового уровня сложности с выбором ответа (тип А),
- задания повышенного уровня сложности с кратким ответом (тип В),
- задания высокого уровня сложности с развернутым ответом (тип С).

К каждому заданию типа А (задания А1–А30) предложены 4 ответа, из которых только один верный. Задание считается выполненным верно, если экзаменуемый указал верный ответ (см. инструкцию по выполнению работы и бланк ответов № 1).

В заданиях типа В (задания В1–В10) в ответе требуется записать число или последовательность цифр (текст решения писать не нужно). Ответ записывается в специальном бланке (см. инструкцию по выполнению работы и бланк ответов № 1).

В заданиях типа С (задания С1–С5) требуется написать текст решения. Текст решения записывается на специальном бланке (см. инструкцию по выполнению работы и бланк ответов № 2). Задания именно этого типа составляют основную часть письменной работы по химии на вступительных экзаменах в вузы.

Задания с развернутым ответом могут быть выполнены выпускниками разными способами. Поэтому решения, приведенные в методических рекомендациях для экзаменаторов, имеются в виду критерии оценивания заданий С части 3 в разделе «Решение заданий варианта 1», следует рассматривать как один из возможных вариантов ответов.

Назначение данного пособия — ознакомить читателей со структурой контрольных измерительных материалов, числом, формой и уровнем сложности заданий. Эти сведе-

ния позволят выпускникам выработать стратегию подготовки и сдачи ЕГЭ в соответствии с целями, которые они ставят перед собой.

В пособии даны ответы к заданиям всех вариантов и приведены подробные решения всех заданий первого варианта. Кроме того, приведены образцы бланков, используемых на ЕГЭ для записи ответов и решений. Именно такой вид имеют контрольные измерительные материалы, которые получают выпускники на экзамене. Прежде чем приступить к решению заданий, изучите внимательно все инструкции.

Настоящее пособие адресовано учащимся-старшеклассникам и абитуриентам для самоподготовки и самоконтроля. Пособие может быть использовано учителями химии и методистами для подготовки учащихся к итоговой аттестации по химии за курс средней школы, причем как в форме ЕГЭ, так и традиционного письменного экзамена.

Инструкция по выполнению работы

На выполнение экзаменационной работы по химии отводится 3 часа (180 минут). Работа состоит из 3 частей и включает 45 заданий.

Часть 1 включает 30 заданий (A1–A30). К каждому заданию даются 4 варианта ответа, из которых *только один правильный*. Внимательно прочитайте каждое задание и проанализируйте все варианты предложенных ответов.

Часть 2 состоит из 10 заданий (B1–B10), на которые надо дать краткий ответ *в виде числа или последовательности цифр*.

Часть 3 содержит 5 наиболее сложных заданий по общей, неорганической и органической химии. Задания C1–C5 требуют *полного (развернутого)* ответа.

Постарайтесь выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удастся выполнить сразу, и переходите к следующему. К пропущенному заданию вы сможете вернуться после выполнения всей работы, если останется время.

При выполнении работы вы можете пользоваться Периодической системой химических элементов Д.И. Менделеева, таблицей растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимическим рядом напряжений металлов (они прилагаются к тексту работы), а также непрограммируемым калькулятором, который выдается на экзамене.

За выполнение различных по сложности заданий дается один или более баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

Желаем успеха!

Blank
ответов № 2



| Регион | Код предмета | Название предмета | Номер варианта |
|--------|--------------|-------------------|----------------|
|--------|--------------|-------------------|----------------|

Перепишите значения указанных выше полей из БЛАНКА РЕГИСТРАЦИИ.
Отвечая на задания теста, пишите аккуратно и разборчиво, соблюдая разметку страницы.
Не забудьте указать номер задания, на которое Вы отвечаете, например, **С1**.
Условия задания переписывать не нужно.

ВНИМАНИЕ! Данный бланк использовать только совместно с двумя другими бланками из данного пакета

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin black lines. There are approximately 20 columns and 20 rows of squares across the entire page. The background is white, and the grid covers almost the entire area, leaving a small margin at the top and bottom.

8

ВАРИАНТ 1

Часть 1

При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под номером выполняемого вами задания (A1–A30) поставьте знак «x» в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа.

A1. Число электронов в ионе Ca^{2+} равно

- | | |
|-------|-------|
| 1) 18 | 3) 22 |
| 2) 20 | 4) 40 |

1 2 3 4 A1

A2. Среди элементов второй группы максимальный радиус атома имеет

- | | |
|-------------|-----------|
| 1) бериллий | 3) кадмий |
| 2) барий | 4) цинк |

1 2 3 4 A2

A3. Соединения с ионной связью расположены в ряду:

- | | |
|---|--|
| 1) F_2 , KCl , NO_2 , NH_3 | 3) CaF_2 , CaSO_4 , H_2O , NH_4F |
| 2) NH_4Cl , LiBr , CaO , BaF_2 | 4) NaNO_3 , HF , NF_3 , ZnO |

1 2 3 4 A3

A4. Степень окисления +2 атом углерода имеет в соединении

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| 1) CO_2 | 3) HCOOH |
| 2) CBr_4 | 4) CH_3COOH |

1 2 3 4 A4

A5. Немолекулярное строение имеет

- | | |
|-------------|-------------------|
| 1) фуллерен | 3) вода |
| 2) алмаз | 4) углекислый газ |

1 2 3 4 A5

A6. В перечне веществ

- | | | |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1) Mn_2O_7 | 2) Cl_2O | 3) Cl_2O_7 |
| 4) MgO | 5) CaO | 6) CrO |

1 2 3 4 A6

к основным оксидам относятся вещества, формулы которых обозначены цифрами

- | | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| 1) 1, 2, 4 | 2) 2, 4, 5 | 3) 1, 2, 6 | 4) 2, 4, 6 |
|------------|------------|------------|------------|

A7. В порядке усиления металлических свойств элементы расположены в ряду:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1) калий, медь, рубидий | 3) медь, рубидий, серебро |
| 2) натрий, калий, медь | 4) медь, калий, рубидий |

1 2 3 4 A7

A8. Формула высшего оксида селена

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| 1) SeO | 3) SeO_3 |
| 2) SeO_2 | 4) Se_2O_7 |

1 2 3 4 A8

A9

1 2 3 4

A9. Верны ли следующие суждения о меди и ее соединениях?

- А. Гидроксид меди (II) относится к кислотным гидроксидам.
Б. Медь практически не растворяется в разбавленной серной кислоте.
- 1) верно только А
 - 2) верно только Б
 - 3) верны оба суждения
 - 4) оба суждения неверны

A10

1 2 3 4

A10. Оксид калия взаимодействует с каждым из двух веществ:

- 1) масляная кислота и вода
- 2) уксусная кислота и водород
- 3) оксид натрия и сера
- 4) оксид кальция и серная кислота

A11

1 2 3 4

A11. С гидроксидом хрома (III) не взаимодействует

- 1) хлорная кислота
- 2) кислород
- 3) гидроксид калия
- 4) гидроксид натрия

A12

1 2 3 4


A12. Раствор гидрокарбоната калия выделяет углекислый газ при действии на него

- 1) хлорида натрия
- 2) угольной кислоты
- 3) любой щелочи
- 4) уксусной кислоты

A13

1 2 3 4

A13. Для осуществления превращений в соответствии со схемой:



необходимо последовательно использовать

- 1) хлор и водород
- 2) хлорид натрия и водород
- 3) хлороводород и цинк
- 4) соляную кислоту и калий

A14

1 2 3 4

A14. Изомерия невозможна для

- | | |
|-------------------|------------|
| 1) 2-метилгексана | 3) пропана |
| 2) циклопропана | 4) пропена |

A15

1 2 3 4

A15. Только один из атомов углерода находится в состоянии sp^3 -гибридизации в молекуле

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1) этана | 3) пропина |
| 2) ацетилена | 4) циклопропана |

A16. Для метанола возможна химическая реакция с

- 1) пропионовой кислотой
- 2) пропаном
- 3) углекислым газом
- 4) гидроксидом железа (II)

1 2 3 4 A16


A17. Верны ли следующие суждения о свойствах сахарозы?

- А. Раствор сахарозы не проводит электрический ток.
Б. При гидролизе сахарозы образуются глюкоза и фруктоза.

- 1) верно только А
- 2) верно только Б
- 3) верны оба суждения
- 4) оба суждения неверны

1 2 3 4 A17

A18. В схеме превращений:



веществом X является

- 1) метанол
- 2) нитрометан
- 3) диметиловый эфир
- 4) дибромметан

1 2 3 4 A18

A19. К реакциям замещения относится взаимодействие

- 1) пропена и воды
- 2) пропена и водорода
- 3) пропена и хлора при комнатной температуре
- 4) пропена и хлора при 600°C


1 2 3 4 A19

A20. К каталитическим процессам относится реакция между

- 1) натрием и водой
- 2) бутеном-1 и водой
- 3) оксидом кальция и водой
- 4) оксидом меди (II) и водородом

1 2 3 4 A20

A21. Для смещения равновесия в сторону продукта реакции в системе



необходимо

- 1) увеличить температуру
- 2) уменьшить давление
- 3) уменьшить концентрацию водорода
- 4) уменьшить температуру

1 2 3 4 A21

A22. Электрический ток не проводят водные растворы

- 1) хлорида калия и гидроксида кальция
- 2) этанола и хлороводорода
- 3) пропанола и ацетона
- 4) глюкозы и ацетата калия

1 2 3 4 A22

A23

1 2 3 4

A23. Осадок образуется при взаимодействии водных растворов

- 1) KCl и $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$
- 2) $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ и $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$
- 3) CaCO_3 и HCl
- 4) AlCl_3 и $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$

A24

1 2 3 4

A24. Восстановительные свойства не характерны для

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1) оксида азота (IV) | 3) водорода |
| 2) алюминия | 4) оксида углерода (II) |

A25

1 2 3 4

A25. Кислую реакции среды имеет водный раствор

- 1) нитрата кальция
- 2) хлорида стронция
- 3) хлорида алюминия
- 4) сульфата цезия

A26

1 2 3 4

A26. Бутан в лаборатории можно получить при взаимодействии

- 1) метилбутана и водорода
- 2) карбида алюминия и воды
- 3) метана и пропана
- 4) хлорэтана и натрия

A27

1 2 3 4

A27. Этанол в промышленности получают

- 1) гидролизом $\text{C}_2\text{H}_5\text{OK}$
- 2) гидролизом $\text{C}_2\text{H}_5-\text{COO}-\text{C}_2\text{H}_5$
- 3) гидролизом $\text{C}_2\text{H}_5-\text{O}-\text{C}_2\text{H}_5$
- 4) гидратацией $\text{CH}_2=\text{CH}_2$

A28

1 2 3 4

A28. Верны ли следующие суждения о правилах обращения с веществами?

- А. Перманганат калия относится к пожаробезопасным веществам.
Б. При получении раствора серной кислоты следует всегда добавлять воду к концентрированной кислоте.
- 1) верно только А
 - 2) верно только Б
 - 3) верны оба суждения
 - 4) оба суждения неверны


A29

1 2 3 4

A29. Одним из важнейших способов получения фенола является выделение его из продуктов

- 1) брожения глюкозы
- 2) коксования каменного угля
- 3) гидролиза целлюлозы
- 4) перегонки мазута

A30. Согласно термохимическому уравнению реакции



при нейтрализации 4 г едкого натра соляной кислотой выделится энергия количеством

- 1) 57 кДж 3) 5,7 кДж
2) 570 кДж 4) 0,57 кДж

Часть 2

Ответом к заданиям этой части (B1–B10) является набор цифр или число, которые следует записать в бланк ответов № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру и запятую в записи десятичной дроби пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке образцами.

В заданиях B1–B5 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных вами ответов, а затем получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк ответов № 1 без пробелов и других символов. (Цифры в ответе могут повторяться.)

B1. Установите соответствие между названием органического соединения и классом, к которому оно принадлежит.

НАЗВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ

- А) метанол
Б) стирол
В) глицерин
Г) дивинил

КЛАСС СОЕДИНЕНИЙ

- 1) простые эфиры
2) сложные эфиры
3) предельные спирты
4) углеводороды
5) предельные карбоновые кислоты
6) ненасыщенные карбоновые кислоты

| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| | | | |

B2. Установите соответствие между формулой соли и степенью окисления углерода в ней.

ФОРМУЛА СОЛИ

- А) K_2CO_3
Б) $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$
В) HCOONa
Г) NaHC_2O_4

СТЕПЕНЬ ОКИСЛЕНИЯ УГЛЕРОДА

- 1) –4
2) –2
3) 0
4) +2
5) +3
6) +4

| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| | | | |


1 2 3 4 **A30**

B1


B2

B3


B3. Установите соответствие между формулой вещества и продуктом, выделяющимся на катоде при электролизе водного раствора этого вещества.

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА**КАТОДНЫЙ ПРОДУКТ**


1) кислород



2) только металл



3) только водород



4) металл и водород

5) азот

6) хлор

| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| | | | |

B4

B4. Установите соответствие между названием соли и способностью ее к гидролизу.

НАЗВАНИЕ СОЛИ**СПОСОБНОСТЬ К ГИДРОЛИЗУ**

А) сульфид аммония

1) гидролизу не подвергается

Б) фосфат калия

2) гидролизуется по катиону

В) сульфид натрия

3) гидролизуется по аниону






Г) сульфат цезия

4) гидролизуется по катиону и аниону

| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| | | | |

B5

B5. Установите соответствие между исходными веществами и основным продуктом их взаимодействия.

ФОРМУЛЫ ВЕЩЕСТВ**ПРОДУКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ**

Ответом к заданиям B6–B8 является последовательность трех цифр, которые соответствуют номерам правильных ответов. Запишите эти цифры в порядке возрастания сначала в текст работы, а затем перенесите их в бланк ответов № 1 без пробелов и других символов.

B6

B6. Углеводороды образуются в ходе реакции

1) карбида кальция с соляной кислотой

2) пропена с водородом

3) бензола с кислородом

4) пропана с водой

5) хлоралканов с натрием

6) хлоралканов с водным раствором щелочи

Ответ: _____.

B7. Метанол не взаимодействует с

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1) бромоводородом | 4) калием |
| 2) водородом | 5) цинком |
| 3) кислородом | 6) фосфором |

Ответ: _____.

B7

B8. Аминоуксусная кислота реагирует с

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1) $\text{Fe}(\text{OH})_2$ | 4) HI |
| 2) Cu | 5) SiO_2 |
| 3) CH_3OH | 6) S |

Ответ: _____.

B8

Ответом к заданиям B9, B10 является число. Запишите это число в текст работы, а затем перенесите его в бланк ответов № 1 без указания единиц измерения.

B9. При смешивании 200 г 10% -ного раствора сульфата меди и 340 г 16% -ного раствора той же соли получится раствор с массовой долей соли _____ %.

(Запишите число с точностью до целых.)

B9

B10. Масса хлорида железа (III), которая может получиться при взаимодействии 67,2 л (н.у.) хлора и 100 г железа, равна _____ г.

(Запишите число с точностью до целых.)


B10

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1.

Часть 3

Для записи ответов к заданиям этой части (C1–C5) используйте бланк ответов № 2. Запишите сначала номер задания (C1 и т.д.), а затем полное решение. Ответы записывайте четко и разборчиво.

C1. Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции



Определите окислитель и восстановитель.


C1

C2. Даны вещества: хлорид алюминия, сода, соляная кислота, гидроксид рубидия. Напишите уравнения четырех возможных реакций между этими веществами.

C2

C3

- C3. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения:

**C4**

- C4. Газ, выделившийся при взаимодействии 6,4 г меди с 200 мл 60%-ной азотной кислоты (плотностью 1,4 г/мл), растворили в 200 г 20%-ного раствора гидроксида калия. Рассчитайте массовую долю нитрата калия в полученном растворе.

C5

- C5. При взаимодействии предельного альдегида массой 5,8 г с избытком гидроксида меди (II) при нагревании образовалось 14,4 г осадка оксида меди (I). Установите молекулярную формулу альдегида.

ВАРИАНТ 2

Часть 1

При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под номером выполняемого вами задания (A1–A30) поставьте знак « x » в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа.

A1. Изотопами являются

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) S^{2-} и S^{6+} | 3) 1H и 2H |
| 2) фосфор белый и фосфор красный | 4) ^{40}K и ^{40}Ar |

1 2 3 4 A1

A2. Среди элементов четвертого периода максимальный радиус атома имеет

- | | |
|----------|------------|
| 1) медь | 3) никель |
| 2) калий | 4) криптон |

1 2 3 4 A2

A3. Наибольшая длина связи в молекуле

- | | |
|--------|-----------|
| 1) HF | 3) H_2O |
| 2) HCl | 4) H_2S |

1 2 3 4 A3

A4. Степень окисления +3 атом хлора имеет в соединении

- | | |
|--------------|------------------|
| 1) ClO_3 | 3) $Ba(ClO_2)_2$ |
| 2) Cl_2O_6 | 4) $KClO_3$ |

1 2 3 4 A4

A5. Немолекулярное строение имеет

- | | |
|------------|----------------|
| 1) железо | 3) кислород |
| 2) водород | 4) угарный газ |

1 2 3 4 A5

A6. В перечне веществ

- 1) CO_2 2) Fe_2O_3 3) Fe_3O_4 4) CaO 5) Cl_2O_7 6) CrO_3

к кислотным оксидам относятся вещества, формулы которых обозначены цифрами

- | | |
|----------|----------|
| 1) 2,3,6 | 3) 1,4,5 |
| 2) 1,5,6 | 4) 2,3,5 |

1 2 3 4 A6

A7. В порядке усиления металлических свойств элементы расположены в ряду:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1) кальций, цинк, стронций | 3) кадмий, барий, ртуть |
| 2) стронций, кадмий, барий | 4) кадмий, барий, радий |

1 2 3 4 A7

A8. Формула высшего оксида теллура

- | | |
|------------|--------------|
| 1) Te_2O | 3) TeO_3 |
| 2) TeO_2 | 4) Te_2O_7 |

1 2 3 4 A8

A9 1 2 3 4

A9. Верны ли следующие суждения о цинке?

- А. Гидроксид цинка (II) относится к амфотерным гидроксидам.
Б. Цинк растворяется в разбавленной азотной кислоте.

- 1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

A10 1 2 3 4

A10. Оксид фосфора (V) не взаимодействует с:

- 1) водой
2) хлоридом натрия
3) гидроксидом калия
4) оксидом кальция

A11 1 2 3 4

A11. Верны ли следующие суждения о серной кислоте?

- А. Концентрированная серная кислота относится к водоотнимающим реагентам.
Б. Разбавленная серная кислота растворяет медь, но не растворяет серебро.

- 1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны


A12 1 2 3 4

A12. Гидрокарбонаты в растворе переходят в карбонаты при действии на них

- 1) любой соли
2) любой кислоты
3) любого оксида
4) любой щелочи

A13 1 2 3 4

A13. Для осуществления превращений в соответствии со схемой:



необходимо последовательно использовать

- 1) воду и азот
2) гидроксид калия и азотную кислоту
3) воду и азотную кислоту
4) гидроксид калия и нитрат калия

A14 1 2 3 4

A14. Изомером циклогексана является

- 1) 3-метилгексан
2) циклопентан
3) бензол
4) гексен-2

A15 1 2 3 4

A15. Единая π -электронная система образуется в молекуле

- 1) циклобутана
2) бутена-1
3) метилциклогексана
4) бензола

A16. Фенол образует белый осадок при взаимодействии с

- 1) бромной водой
- 2) азотной кислотой
- 3) гидроксидом калия
- 4) аммиаком

1 2 3 4 A16


A17. Верны ли следующие суждения о жирах?

- А. Все жиры твёрдые при обычных условиях вещества.
Б. С химической точки зрения жиры относятся к сложным эфирам.

- 1) верно только А
- 2) верно только Б
- 3) верны оба суждения
- 4) оба суждения неверны

1 2 3 4 A17

A18. В схеме превращений:



веществом X является

- 1) этин
- 2) этандиол
- 3) этен
- 4) дибромэтан

1 2 3 4 A18

A19. К экзотермическим реакциям относится взаимодействие

- 1) азота с кислородом
- 2) углерода с углекислым газом
- 3) воды с углеродом
- 4) пропена с бромом


1 2 3 4 A19

A20. Скорость реакции цинка с раствором серной кислоты не зависит от

- 1) числа взятых гранул цинка
- 2) степени измельчения цинка
- 3) концентрации серной кислоты
- 4) температуры

1 2 3 4 A20

A21. Для смещения равновесия в сторону исходных веществ в системе



необходимо

- 1) увеличить температуру
- 2) увеличить давление
- 3) увеличить концентрацию азота
- 4) уменьшить температуру

1 2 3 4 A21

A22. Электролитами являются оба вещества:

- 1) уксусная кислота и этилацетат
- 2) бромоводород и этанол
- 3) пропанол и ацетон
- 4) пропионовая кислота и ацетат натрия

1 2 3 4 A22

A23 1 2 3 4**A23.** Газ выделяется при взаимодействии водных растворов

- | | |
|--|---|
| 1) CaCl_2 и $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ | 3) NaHCO_3 и HI |
| 2) $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ и $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ | 4) AlCl_3 и $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ |

A24 1 2 3 4**A24.** Наиболее сильные восстановительные свойства проявляет

- | | |
|------------|---------------------|
| 1) иод | 3) медь |
| 2) водород | 4) оксид азота (II) |

A25 1 2 3 4**A25.** Кислую реакцию среды имеет водный раствор

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1) KHCO_3 | 3) CuSO_4 |
| 2) K_2SO_3 | 4) Na_2SO_4 |

A26 1 2 3 4**A26.** Верны ли следующие суждения об алкинах?

- А. Молекулы всех алкинов содержат две π -связи.
В. Ацетилен обесцвечивает водный раствор перманганата калия.
- | |
|-------------------------|
| 1) верно только А |
| 2) верно только В |
| 3) верны оба суждения |
| 4) оба суждения неверны |

A27 1 2 3 4**A27.** Этанол образует сложный эфир при реакции с

- | | |
|--------------|-------------|
| 1) метанолом | 3) пропином |
| 2) глицином | 4) натрием |

A28 1 2 3 4**A28.** Верны ли следующие суждения о правилах работы в лаборатории?

- А. В лаборатории нельзя знакомиться с запахом веществ.
Б. Все соли натрия и калия даже в умеренных дозах ядовиты для человека.
- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1) верно только А | 3) верны оба суждения |
| 2) верно только Б | 4) оба суждения неверны |

A29 1 2 3 4**A29.** Промышленное получение аммиака основано на реакции, схема которой:

- | |
|--|
| 1) $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{NH}_4\text{Cl} \rightarrow$ |
| 2) $\text{Mg}_3\text{N}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$ |
| 3) $\text{H}_2 + \text{N}_2 \xrightarrow[t^0]{\text{кат.}, P}$ |
| 4) $\text{NH}_4\text{Cl} \xrightarrow{t^0}$ |

A30 1 2 3 4**A30.** При взаимодействии 40 л кислорода и 40 л водорода останется в избытке

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1) 20 л водорода | 3) 10 л водорода |
| 2) 10 л кислорода | 4) 20 л кислорода |

Часть 2

Ответом к заданиям этой части (В1–В10) является набор цифр или число, которые следует записать в бланк ответов № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру и запятую в записи десятичной дроби пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке образцами.

В заданиях В1–В5 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных вами ответов, а затем получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк ответов № 1 без пробелов и других символов. (Цифры в ответе могут повторяться).

- В1.** Установите соответствие между названием неорганического соединения и классом, к которому оно принадлежит.

B1

| НАЗВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ | КЛАСС СОЕДИНЕНИЙ |
|---------------------|------------------|
| А) угарный газ | 1) средние соли |
| Б) мрамор | 2) кислые соли |
| В) пищевая сода | 3) основные соли |
| Г) гашеная известь | 4) кислоты |
| | 5) основания |
| | 6) оксиды |

| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| | | | |

- В2.** Установите соответствие между формулой соли и степенью окисления хрома в ней.

B2

| ФОРМУЛА СОЛИ | СТЕПЕНЬ ОКИСЛЕНИЯ ХРОМА |
|-----------------------|-------------------------|
| А) K_2CrO_4 | 1) 0 |
| Б) $CaCr_2O_7$ | 2) +2 |
| В) CrO_2F_2 | 3) +3 |
| Г) $Ba_3[Cr(OH)_6]_2$ | 4) +4 |
| | 5) +5 |
| | 6) +6 |


| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| | | | |

B3

- B3.** Установите соответствие между формулой вещества и продуктом, выделяющимся на катоде при электролизе водного раствора этого вещества.

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА**КАТОДНЫЙ ПРОДУКТ**


1) кислород



2) только металл



3) только водород



4) металл и водород

5) азот

6) хлор

| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| | | | |

B4

- B4.** Установите соответствие между названием соли и способностью ее к гидролизу.

НАЗВАНИЕ СОЛИ**СПОСОБНОСТЬ К ГИДРОЛИЗУ**

А) сульфид цезия

1) гидролизу не подвергается

Б) нитрат бария

2) гидролизуется по катиону

В) сульфат натрия

3) гидролизуется по аниону





Г) карбонат аммония

4) гидролизуется по катиону и аниону

| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| | | | |

B5

- B5.** Установите соответствие между исходными веществами и основным продуктом их взаимодействия.

ФОРМУЛЫ ВЕЩЕСТВ**ПРОДУКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ**1) RbAlO_2 2) $\text{Rb}_3[\text{Al}(\text{OH})_6]$ 3) CsAlO_2 4) $\text{Cs}_3[\text{Al}(\text{OH})_6]$

| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ответом к заданиям B6–B8 является последовательность трех цифр, которые соответствуют номерам правильных ответов. Запишите эти цифры в порядке возрастания сначала в текст работы, а затем перенесите их в бланк ответов № 1 без пробелов и других символов.

В6. По радикальному механизму протекает взаимодействие

- 1) пропена и бромной воды
- 2) пропена и бромоводорода
- 3) пропена и хлора (в водном растворе)
- 4) пропена и хлора (при 500°C)
- 5) этана и кислорода
- 6) метана и хлора

Ответ: _____.

В6

В7. Метанол в соответствующих условиях может быть получен по реакции

- 1) $\text{CH}_3\text{ONa} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$
- 2) $\text{CH}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$
- 3) $\text{HCCl}_3 + \text{KOH} \rightarrow$
- 4) $\text{HCON} + \text{H}_2 \rightarrow$
- 5) $\text{CO} + \text{H}_2 \rightarrow$
- 6) $\text{CH}_3\text{Cl} + \text{O}_2 + \text{H}_2 \rightarrow$

Ответ: _____.

В7

В8. Глицин вступает в реакцию этерификации с

- 1) пропанолом-1
- 2) пропанолом-2
- 3) уксусной кислотой
- 4) оксидом магния
- 5) этиловым спиртом
- 6) металлическим кальцием

Ответ: _____.

В8

Ответом к заданиям В9, В10 является число. Запишите это число в текст работы, а затем перенесите его в бланк ответов № 1 без указания единиц измерения.

В9. Если 1 кг 10%-ного раствора хлорида калия смешать с 3 кг 15%-ного раствора той же соли, то получится раствор с массовой долей KCl, равной _____ %.

(Запишите число с точностью до десятых.)

В9

В10. Объем фосфина, который выделится при гидролизе 35 г фосфида кальция, содержащего 4% примесей, равен _____ л (н.у.).

(Запишите число с точностью до целых).

В10

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1.

Часть 3

Для записи ответов к заданиям этой части (С1–С5) используйте бланк ответов № 2. Запишите сначала номер задания (С1 и т.д.), а затем полное решение. Ответы записывайте четко и разборчиво.

С1

- С1. Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции




Определите окислитель и восстановитель.

С2

- С2. Даны вещества: сера, водород, хлорная кислота, гидроксид цезия. Напишите уравнения четырех возможных реакций между этими веществами.

С3

- С3. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения:



С4

- С4. Газ, выделившийся при взаимодействии 3,2 г меди с 100 мл 60%-ной азотной кислоты (плотностью 1,4 г/мл), растворили в 100 г 15%-ного раствора гидроксида натрия. Рассчитайте массовую долю нитрита натрия в полученном растворе.

С5

- С5. Установите молекулярную формулу вторичного амина, массовая доля азота в котором равна 23,7%.

ВАРИАНТ 3

Часть 1

При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под номером выполняемого вами задания (A1–A30) поставьте знак « x » в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа.

- A1. Электронная конфигурация $1s^2 2s^2 2p^6$ отвечает
- 1) атому фтора
 - 2) оксид-иону
 - 3) атому натрия
 - 4) сульфид-иону
- A2. Кислотные свойства в ряду высших оксидов углерода — кремния — фосфора
- 1) возрастают
 - 2) ослабевают
 - 3) сначала возрастают, затем ослабевают
 - 4) сначала ослабевают, затем возрастают
- A3. Одна из связей образована по донорно-акцепторному механизму в
- 1) молекуле водорода
 - 2) молекуле пероксида водорода
 - 3) ионе аммония
 - 4) молекуле аммиака
- A4. Степень окисления +2, а валентность IV атом углерода имеет в соединении
- 1) CO
 - 2) CO₂
 - 3) HCOOH
 - 4) CH₂Cl₂
- A5. Наибольшую температуру плавления имеет
- 1) хлорид калия
 - 2) бром
 - 3) вода
 - 4) оксид углерода (IV)
- A6. В перечне веществ
- 1) Al(OH)₃ 2) HCl 3) H₂S 4) Ca(OCl)₂ · 4H₂O 5) KOH 6) H₂SO₄
- к гидроксидам относятся вещества, формулы которых обозначены цифрами
- 1) 1,4,5 2) 1,4,6 3) 2,3,4 4) 1,5,6
- A7. Верны ли следующие суждения о хrome и его соединениях?
- А. Степень окисления хрома в высшем оксиде равна + 3.
- Б. Оксид хрома (II) — хороший восстановитель.
- 1) верно только А
 - 2) верно только Б
 - 3) верны оба суждения
 - 4) оба суждения неверны

1 2 3 4 A1

1 2 3 4 A2

1 2 3 4 A3

1 2 3 4 A4

1 2 3 4 A5

1 2 3 4 A6

1 2 3 4 A7

A8**1 2 3 4**

A8. В соответствии с положением хлора в Периодической системе он может проявлять степень окисления

- 1) -1, +1, +3, +5, +7
- 2) только -1, +7
- 3) только +7
- 4) только -1

A9**1 2 3 4**

A9. Верны ли следующие суждения о сере?

А. Сера горит на воздухе с образованием SO_3 .
Б. При взаимодействии серы с металлами образуются сульфиты.

- 1) верно только А
- 2) верно только Б
- 3) верны оба суждения
- 4) оба суждения неверны

A10**1 2 3 4**

A10. Оксид хрома (VI) взаимодействует с каждым из двух веществ:

- 1) оксидом кремния и углекислым газом
- 2) водой и углекислым газом
- 3) водой и гидроксидом натрия
- 4) кислородом и водородом

A11**1 2 3 4**

A11. Азотная кислота

- 1) относится к довольно слабым электролитам
- 2) разлагается при хранении и при нагревании
- 3) не растворяет металлическую медь
- 4) получается в промышленности из нитратов


A12**1 2 3 4**

A12. Для получения дигидрофосфата кальция средний фосфат следует обработать

- 1) серной кислотой
- 2) угольной кислотой
- 3) водой
- 4) гидроксидом кальция

A13**1 2 3 4**

A13. Для осуществления превращений в соответствии со схемой:



необходимо последовательно использовать

- 1) кислород, воду, воду
- 2) кислород, азотную кислоту, воду
- 3) воду, гидроксид калия, соляную кислоту
- 4) кислород, кислород, воду

A14**1 2 3 4**

A14. Не является изомером гексена-2

- 1) гексен-1
- 2) циклогексан
- 3) 2-метилпентен-1
- 4) гексадиен-1,3

A15. Две π -связи имеются в молекуле

- | | |
|------------|-----------------|
| 1) этана | 3) пропина |
| 2) бензола | 4) циклопропена |

1 2 3 4 A15

A16. Метанол проявляет двойственные свойства, реагируя с

- 1) натрием и калием
- 2) натрием и бромоводородом
- 3) бромоводородом и хлороводородом
- 4) кислородом и фтором

1 2 3 4 A16


A17. Верны ли следующие суждения об углеводах?

- А. Все углеводы сладкие на вкус вещества.
Б. Все углеводы имеют общую формулу $C_n(H_2O)_m$.

- 1) верно только А
- 2) верно только Б
- 3) верны оба суждения
- 4) оба суждения неверны

1 2 3 4 A17

A18. В схеме превращений:



веществом X является

- | | |
|-----------|----------------|
| 1) ксилол | 3) фенол |
| 2) толуол | 4) нитробензол |

1 2 3 4 A18

A19. К окислительно-восстановительным реакциям не относится взаимодействие

- 1) пропана и хлора
- 2) хлора и водорода
- 3) метанола и уксусной кислоты
- 4) кальция и хлоруксусной кислоты

1 2 3 4 A19

A20. Для увеличения скорости взаимодействия железа с кислородом следует

- 1) уменьшить давление кислорода
- 2) измельчить железо
- 3) взять несколько брусков железа
- 4) уменьшить температуру

1 2 3 4 A20


A21. Изменение давления практически не скажется на состоянии равновесия в системе:

- 1) $A_{2(газ)} + B_{2(газ)} \rightleftharpoons 2AB_{(тв.)}$
- 2) $A_{2(газ)} + B_{2(тв.)} \rightleftharpoons 2AB_{(тв.)}$
- 3) $A_{2(газ)} + B_{2(газ)} \rightleftharpoons 2AB_{(газ)}$
- 4) $A_{2(газ)} + B_{2(тв.)} \rightleftharpoons 2AB_{(газ)}$

1 2 3 4 A21

A22 1 2 3 4**A22.** Слабым электролитом является

- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| 1) HCOOK | 3) $(\text{HCOO})_2\text{Ca}$ |
| 2) HCOOH | 4) $\text{Ca}(\text{OH})_2$ |

A23 1 2 3 4**A23.** Краткое ионное уравнение

отвечает взаимодействию

- 1) плавиковой кислоты и гидроксида алюминия
- 2) соляной кислоты и гидроксида бария
- 3) азотной кислоты и гидроксида меди
- 4) угольной кислоты и гидроксида кальция

A24 1 2 3 4**A24.** Водород проявляет свойства окислителя в реакции, схема которой:

- | | |
|---|--|
| 1) $\text{C} + \text{H}_2 \xrightarrow{t^\circ}$ | 3) $\text{Ca} + \text{H}_2 \xrightarrow{t^\circ}$ |
| 2) $\text{CO}_2 + \text{H}_2 \xrightarrow{t^\circ}$ | 4) $\text{FeO} + \text{H}_2 \xrightarrow{t^\circ}$ |

A25 1 2 3 4**A25.** Среда водного раствора гидрокарбоната натрия

- | | |
|------------------|----------------|
| 1) нейтральная | 3) слабокислая |
| 2) сильноокислая | 4) щелочная |

A26 1 2 3 4**A26.** Бутан может быть получен при

- 1) дегидратации бутанола-1
- 2) взаимодействии 1,2-дихлорбутана с цинком
- 3) взаимодействии хлорэтана с натрием
- 4) взаимодействии метана с пропаном

A27 1 2 3 4**A27.** Диэтиловый эфир образуется при

- 1) гидролизе этилового эфира уксусной кислоты
- 2) гидратации этена
- 3) внутримолекулярной дегидратации этанола
- 4) межмолекулярной дегидратации этанола

A28 1 2 3 4**A28.** Верны ли следующие суждения о качественных реакциях на белки?

А. С солями свинца белки дают оранжевое окрашивание.

Б. При действии азотной кислоты на белок появляется жёлтое окрашивание.

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1) верно только А | 3) верны оба суждения |
| 2) верно только Б | 4) оба суждения неверны |

A29 1 2 3 4**A29.** Пирометаллургический метод получения металлов отражает реакция:

- | | |
|--|--|
| 1) $\text{HgS} + \text{O}_2 \rightarrow \text{Hg} + \text{SO}_2$ | 3) $2\text{NaCl} \xrightarrow{\text{электролиз}} 2\text{Na} + \text{Cl}_2$ |
| 2) $\text{CuSO}_4 + \text{Fe} \rightarrow \text{FeSO}_4 + \text{Cu}$ | 4) $\text{CuSO}_4 + \text{Zn} \rightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{Cu}$ |

A30. Теплота образования хлороводорода из простых веществ равна 92 кДж/моль. Количество теплоты, выделившееся при образовании 146 г хлороводорода, равно

- 1) 92 кДж 3) 18,4 кДж
2) 184 кДж 4) 368 кДж

1 2 3 4 A30

Часть 2

Ответом к заданиям этой части (B1–B10) является набор цифр или число, которые следует записать в бланк ответов № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру и запятую в записи десятичной дроби пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке образцами.

В заданиях B1–B5 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных вами ответов, а затем получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк ответов № 1 без пробелов и других символов. (Цифры в ответе могут повторяться.)

B1. Установите соответствие между формулой органического соединения и его названием.

ФОРМУЛА СОЕДИНЕНИЯ

НАЗВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ

A) $\text{CH}_3\text{—OH}$

1) дивинил

Б) $\text{C}_6\text{H}_5\text{—CH=CH}_2$

2) метанол

В) $\text{CH}_2(\text{OH})\text{—CH}_2(\text{OH})$

3) изопрен

Г) $\text{CH}_2=\text{CH—CH=CH}_2$

4) этандиол

5) толуол

6) стирол

| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| | | | |

B1

B2. Установите соответствие между схемой реакции и формулой окислителя в ней.

СХЕМА РЕАКЦИИ

ФОРМУЛА ОКИСЛИТЕЛЯ

A) $\text{K}_2\text{CO}_3 + \text{Br}_2 \rightarrow \text{KBr} + \text{KBrO}_3 + \text{CO}_2$

1) K_2CO_3

Б) $\text{Br}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{BrCl}$

2) Br_2

В) $\text{Br}_2 + \text{I}_2 \rightarrow \text{IBr}$

3) Cl_2

Г) $\text{HBr} + \text{HBrO}_3 \rightarrow \text{Br}_2 + \text{H}_2\text{O}$

4) I_2

5) HBr

6) HBrO_3

| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| | | | |

B2

B3


B3. Установите соответствие между формулой вещества и продуктом, выделяющимся на аноде при электролизе водного раствора этого вещества.

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА**АНОДНЫЙ ПРОДУКТ**


1) кислород



2) металл



3) водород



4) азот

5) углекислый газ

6) хлор

| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| | | | |

B4

B4. Установите соответствие между названием соли и средой ее водного раствора.

НАЗВАНИЕ СОЛИ**СРЕДА РАСТВОРА**

А) хлорид хрома (III)

1) нейтральная

Б) сульфат хрома (II)

2) кислая

В) сульфид натрия








3) щелочная

Г) сульфат цезия

| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| | | | |

B5

B5. Установите соответствие между исходными веществами и продуктами их взаимодействия.

ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА**ПРОДУКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ**

| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ответом к заданиям B6–B8 является последовательность трех цифр, которые соответствуют номерам правильных ответов. Запишите эти цифры в порядке возрастания сначала в текст работы, а затем перенесите их в бланк ответов № 1 без пробелов и других символов.

B6. В соответствии с правилом В.В. Марковникова происходит взаимодействие

- 1) бутена-1 с бромоводородом
- 2) пропена с водородом
- 3) хлороводорода с этеном
- 4) хлороводорода с пропеном
- 5) пентена-1 с водой
- 6) воды с бутеном-2

Ответ: _____.

B6

B7. Сложный эфир образуется при взаимодействии

- 1) уксусной кислоты и карбоната калия
- 2) муравьиной кислоты и метанола
- 3) масляной кислоты и изопропилового спирта
- 4) бутанола-1 и натрия
- 5) бутанола-2 и глицина
- 6) аминоксусной кислоты и едкого натра

Ответ: _____.

B7

B8. Аминопропионовая кислота не реагирует с

- 1) Zn(OH)_2
- 2) Hg
- 3) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$
- 4) HClO_4
- 5) SiO_2
- 6) C_2H_6

Ответ: _____.

B8

Ответом к заданиям B9, B10 является число. Запишите это число в текст работы, а затем перенесите его в бланк ответов № 1 без указания единиц измерения.

B9. При смешивании 175 г 10%-ного раствора и 375 г 16%-ного раствора аммиачной селитры получится раствор с содержанием соли _____ г.

(Запишите число с точностью до десятых).

B9

B10. Объем сероводорода, который может быть получен при действии избытка серной кислоты на 35,2 г сульфида железа (II), равен _____ л (н.у.).

(Запишите число с точностью до целых.)

B10


Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1.

Часть 3

Для записи ответов к заданиям этой части (С1–С5) используйте бланк ответов № 2. Запишите сначала номер задания (С1 и т.д.), а затем полное решение. Ответы записывайте четко и разборчиво.

С1

- С1. Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции




Определите окислитель и восстановитель.

С2

- С2. Даны вещества: хлорид магния, карбонат калия, хлороводородная кислота, гидроксид лития. Напишите уравнения четырех возможных реакций между этими веществами.

С3

- С3. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения:



С4

- С4. Какую массу оксида серы (VI) следует добавить к 500 г 20% -го раствора серной кислоты, чтобы увеличить ее массовую долю вдвое?

С5

- С5. Установите молекулярную формулу предельной карбоновой кислоты, натриевая соль которой содержит 33,82% металла.

ВАРИАНТ 4

Часть 1

При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под номером выполняемого вами задания (A1–A30) поставьте знак « x » в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа.

A1. К s-элементам относится каждый из элементов:

- 1) натрий и алюминий
- 2) калий и аргон
- 3) барий и гелий
- 4) кальций и хлор

1 2 3 4 A1

A2. Кислотные свойства в ряду высших гидроксидов серы — хлора — иода

- 1) возрастают
- 2) ослабевают
- 3) сначала возрастают, затем ослабевают
- 4) сначала ослабевают, затем возрастают

1 2 3 4 A2

A3. Одна из связей образована по донорно-акцепторному механизму в

- 1) хлориде натрия
- 2) бромиде аммония
- 3) бромиде алюминия
- 4) хлориде железа (II)

1 2 3 4 A3

A4. Степень окисления –3, а валентность IV атом азота имеет в соединении

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| 1) HNO_2 | 3) HNO_3 |
| 2) NF_3 | 4) NH_4Cl |

1 2 3 4 A4

A5. Наибольшую температуру плавления имеет

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1) оксид углерода (II) | 3) серная кислота |
| 2) иод | 4) сульфат натрия |

1 2 3 4 A5

A6. В перечне веществ

- | | | |
|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1) HNO_2 | 4) H_2S | 3) HClO_4 |
| 2) HNO_3 | 5) HCl | 4) H_2SO_3 |

1 2 3 4 A6

к сильным кислотам относятся вещества, формулы которых обозначены цифрами

- | | |
|----------|----------|
| 1) 1,2,5 | 3) 2,5,6 |
| 2) 2,3,4 | 4) 2,3,5 |

A7

1 2 3 4

A7. Наиболее устойчивые производные железа образует в степенях окисления

1) +1, +2

3) +3, +4

2) +2, +3

4) +3, +8

A8

1 2 3 4

A8. Не проявляет своей высшей валентности, равной номеру группы, элемент

1) углерод

3) фосфор

2) хлор

4) фтор

A9

1 2 3 4

A9. Верны ли следующие суждения о фосфоре?

А. Фосфор горит на воздухе с образованием P_2O_5 .

Б. При взаимодействии фосфора с металлами образуются фосфиды.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

A10

1 2 3 4

A10. Оксид хлора (VII) взаимодействует с каждым из двух веществ:

1) кислородом и водородом

2) водой и углекислым газом

3) водородом и гидроксидом кальция

4) кремнием и гелием

A11

1 2 3 4

A11. Ортофосфорная кислота

1) относится к наиболее сильным электролитам

2) легко разлагается при хранении

3) не взаимодействует с щелочными металлами

4) получается в промышленности из фосфора или фосфатов

A12

1 2 3 4

A12. Хлорид аммония в отличие от хлорида калия

1) хорошо растворяется в воде

2) легко разлагается при нагревании


3) дает осадок с нитратом серебра

4) не реагирует с щелочами

A13

1 2 3 4

A13. Для осуществления превращений в соответствии со схемой:



необходимо последовательно использовать

1) водород, гидроксид кальция, соляную кислоту

2) водород, азотную кислоту, кальций

3) воду, гидроксид кальция, серную кислоту

4) гидроксид кальция, воду, оксид кальция

A14. Взаимное влияние атомов в молекуле можно объяснить на примере реакции между

- 1) метаном и хлором
- 2) метаном и бромом
- 3) циклопропаном и водородом
- 4) фенолом и бромной водой

1 2 3 4 A14

A15. В отличие от пропена пропин взаимодействует с

- 1) аммиачным раствором оксида серебра
- 2) бромной водой
- 3) раствором перманганата калия
- 4) хлороводородом

1 2 3 4 A15

A16. Каждый из атомов кислорода в молекуле этиленгликоля образует

- 1) одну σ -связь
- 2) одну π -связь
- 3) две σ -связи
- 4) одну σ -связь и одну π -связь

1 2 3 4 A16


A17. Верны ли следующие суждения об углеводах?

- А. К полисахаридам относятся целлюлоза и крахмал.
Б. Глюкоза типичный представитель гексоз.

- 1) верно только А
- 2) верно только Б
- 3) верны оба суждения
- 4) оба суждения неверны

1 2 3 4 A17

A18. В схеме превращений:



веществом X является

- | | |
|---|---|
| 1) $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$ | 3) $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ |
| 2) $\text{C}_6\text{H}_5\text{C}_2\text{H}_5$ | 4) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{OH}$ |

1 2 3 4 A18

A19. К реакциям замещения относится взаимодействие

- 1) уксусной кислоты и гидроксида натрия
- 2) уксусной кислоты и хлора
- 3) уксусной кислоты и соды
- 4) уксусной кислоты и глицина

1 2 3 4 A19

A20. Для увеличения скорости взаимодействия цинка с хлором следует

- 1) уменьшить давление хлора
- 2) уменьшить температуру
- 3) добавить несколько гранул цинка
- 4) измельчить цинк

1 2 3 4 A20

A21 1 2 3 4

A21. Изменение давления приведет к смещению равновесия в системе:

- 1) $A_{2(газ)} + B_{2(газ)} \rightleftharpoons 2AB_{(тв.)}$
- 2) $2A_{(газ)} + B_{2(тв.)} \rightleftharpoons 2AB_{(газ)}$
- 3) $A_{2(тв.)} + B_{2(газ)} \rightleftharpoons A_2B_{2(газ)}$
- 4) $A_{(газ)} + B_{2(тв.)} \rightleftharpoons AB_{2(газ)}$


A22 1 2 3 4

A22. В водном растворе мышьяковой кислоты H_3AsO_4 наименьшая концентрация частиц

- 1) H_3AsO_4
- 2) H_2AsO_4
- 3) $HAsO_4$
- 4) AsO_4

A23 1 2 3 4

A23. Краткое ионное уравнение



отвечает взаимодействию

- 1) соляной кислоты и сульфида железа
- 2) соляной кислоты и сульфида калия
- 3) азотной кислоты и сульфида меди
- 4) угольной кислоты и сульфида натрия

A24 1 2 3 4

A24. Водород проявляет свойства восстановителя в реакции, схема которой:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1) $Na + H_2 \xrightarrow{t^\circ}$ | 3) $Ca + H_2 \xrightarrow{t^\circ}$ |
| 2) $C + H_2 \xrightarrow{t^\circ}$ | 4) $Ba + H_2 \xrightarrow{t^\circ}$ |

A25 1 2 3 4

A25. Одинаковую среду имеют водные растворы сульфида натрия и

- 1) хлорида калия
- 2) нитрата цинка
- 3) карбоната рубидия
- 4) нитрата алюминия

A26 1 2 3 4

A26. Бутан в отличие от бутена-2

- 1) реагирует с кислородом
- 2) не вступает в реакцию гидрирования
- 3) не реагирует с хлором
- 4) имеет структурный изомер

A27 1 2 3 4

A27. С металлическим натрием не взаимодействует

- 1) этанол
- 2) глицерин
- 3) хлорпропан
- 4) диэтиловый эфир

A28. Верны ли следующие суждения о качественных реакциях?

- А. С солями свинца все соли натрия дают чёрный осадок.
 Б. При действии азотной кислоты на карбонат-ионы появляется жёлтое окрашивание без выделения газа.

- 1) верно только А 3) верны оба суждения
 2) верно только Б 4) оба суждения неверны

1 2 3 4 **A28**

A29. Гидрометаллургический метод получения металлов отражает реакция:

- 1) $\text{HgS} + \text{O}_2 \rightarrow \text{Hg} + \text{SO}_2$ 3) $2\text{NaCl} \xrightarrow{\text{электролиз}} 2\text{Na} + \text{Cl}_2$
 2) $\text{CuSO}_4 + \text{Fe} \rightarrow \text{FeSO}_4 + \text{Cu}$ 4) $\text{AlCl}_3 + 3\text{K} \rightarrow \text{Al} + 3\text{KCl}$

1 2 3 4 **A29**

A30. Максимальный объем аммиака, который теоретически может быть получен исходя из 40 л азота и 30 л водорода, при н.у. составит

- 1) 40 л 3) 70 л
 2) 30 л 4) 20 л

1 2 3 4 **A30**

Часть 2

Ответом к заданиям этой части (В1–В10) является набор цифр или число, которые следует записать в бланк ответов № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру и запятую в записи десятичной дроби пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке образцами.

В заданиях В1–В5 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных вами ответов, а затем получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк ответов № 1 без пробелов и других символов. (Цифры в ответе могут повторяться).

В1. Установите соответствие между формулой органического соединения и его названием.

ФОРМУЛА СОЕДИНЕНИЯ

НАЗВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ





- | | |
|---|-------------|
| А) $\text{C}_2\text{H}_5\text{—OH}$ | 1) дивинил |
| Б) $\text{C}_6\text{H}_5\text{—CH=CH}_2$ | 2) этанол |
| В) $\text{CH}_2(\text{OH})\text{—CH}(\text{OH})\text{—CH}_2(\text{OH})$ | 3) изопрен |
| Г) $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{—CH=CH}_2$ | 4) глицерин |
| | 5) толуол |
| | 6) стирол |

В1

| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| | | | |

B2


B2. Установите соответствие между схемой реакции и формулой восстановителя в ней.

СХЕМА РЕАКЦИИ**ФОРМУЛА ВОССТАНОВИТЕЛЯ**

| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| | | | |

B3


B3. Установите соответствие между формулой вещества и продуктом, выделяющимся на аноде при электролизе водного раствора этого вещества.

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА**АНОДНЫЙ ПРОДУКТ**

1) кислород



2) металл



3) водород



4) сера

5) фтор

6) хлор

| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| | | | |

B4

B4. Установите соответствие между названием соли и средой ее водного раствора.

НАЗВАНИЕ СОЛИ**СРЕДА РАСТВОРА**

А) хлорид золота (III)

1) нейтральная

Б) сульфат железа (II)

2) кислая

В) ортофосфат цезия






3) щелочная

Г) ацетат калия

| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| | | | |

B5

B5. Установите соответствие между простыми веществами и формулами реагентов, с которыми они могут взаимодействовать.

ПРОСТОЕ ВЕЩЕСТВО**ФОРМУЛЫ РЕАГЕНТОВ**

Ответом к заданиям В6–В8 является последовательность трех цифр, которые соответствуют номерам правильных ответов. Запишите эти цифры в порядке возрастания сначала в текст работы, а затем перенесите их в бланк ответов № 1 без пробелов и других символов.

В6. Радикалами являются частицы

- | | |
|-------------|----------|
| 1) C_2H_5 | 4) N_2 |
| 2) NO_2 | 5) He |
| 3) CH_4 | 6) Br |

Ответ: _____.

В6

В7. Сложный эфир не образуется при взаимодействии

- 1) муравьиной кислоты и карбоната натрия
- 2) уксусной кислоты и пропанола
- 3) пропионовой кислоты и изопропилового спирта
- 4) бутанола-2 и калия
- 5) бутанола-2 и фенилаланина
- 6) глицина и гидроксида магния

Ответ: _____.

В7

В8. Аминобутановая кислота реагирует с

- | | |
|---------------|-------------|
| 1) $Mg(OH)_2$ | 4) $HBrO_4$ |
| 2) Cu | 5) SiO_2 |
| 3) C_3H_7OH | 6) C_3H_8 |

Ответ: _____.

В8

Ответом к заданиям В9, В10 является число. Запишите это число в текст работы, а затем перенесите его в бланк ответов № 1 без указания единиц измерения.

В9. При смешивании 155 г 5%-ного раствора и 207 г 11%-ного раствора мочевины получится раствор с содержанием мочевины _____ г.

(Запишите число с точностью до десятых).

В9

В10. Объем сероводорода, который выделится при действии избытка соляной кислоты на 10 г сульфида алюминия, равен _____ л (н.у.).

(Запишите число с точностью до десятых).

В10


Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1.

Часть 3

Для записи ответов к заданиям этой части (С1–С5) используйте бланк ответов № 2. Запишите сначала номер задания (С1 и т.д.), а затем полное решение. Ответы записывайте четко и разборчиво.

С1

- С1. Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции




Определите окислитель и восстановитель.

С2

- С2. Даны вещества: сера, гидроксид натрия, азотная кислота, ортофосфорная кислота. Напишите уравнения четырех возможных реакций между этими веществами.

С3

- С3. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения:



С4

- С4. Какую массу оксида селена (VI) следует добавить к 100 г 15%-го раствора селеновой кислоты, чтобы увеличить ее массовую долю вдвое?

С5

- С5. Установите молекулярную формулу предельной карбоновой кислоты, калиевая соль которой содержит 28,57% кислорода.

ВАРИАНТ 5

Часть 1

При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под номером выполняемого вами задания (A1–A30) поставьте знак « x » в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа.

A1. Число нейтронов в ядре атома изотопа ^{32}P :

- | | |
|-------|-------|
| 1) 15 | 3) 31 |
| 2) 17 | 4) 32 |

1 2 3 4 A1

A2. Наименьшим атомным радиусом обладает

- | | |
|-------------|-----------|
| 1) алюминий | 3) натрий |
| 2) аргон | 4) магний |

1 2 3 4 A2

A3. Водородная связь реализуется

- 1) в молекуле водорода
- 2) в молекуле воды
- 3) между молекулами водорода
- 4) между молекулами воды

1 2 3 4 A3

A4. Валентность элемента равна

- 1) числу образуемых им σ -связей
- 2) числу образуемых им π -связей
- 3) числу образуемых им ковалентных связей
- 4) степени окисления с противоположным знаком

1 2 3 4 A4

A5. Как правило, наибольшую температуру плавления имеют

- 1) вещества с ионной решеткой
- 2) вещества с молекулярной решеткой
- 3) вещества с металлической решеткой
- 4) вещества аморфные

1 2 3 4 A5

A6. В перечне веществ

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1) CO_2 | 4) CaO |
| 2) Fe_2O_3 | 5) Cl_2O_7 |
| 3) ZnO | 6) Al_2O_3 |

1 2 3 4 A6

к амфотерным оксидам относятся вещества, формулы которых обозначены цифрами

- | | |
|----------|----------|
| 1) 1,5,6 | 3) 2,3,4 |
| 2) 3,4,6 | 4) 2,3,6 |

A7

1 2 3 4

A7. Число неспаренных электронов в атоме цинка в основном состоянии равно

- 1) 0
- 2) 1
- 3) 2
- 4) 4

A8

1 2 3 4

A8. Среди элементов VIIA-группы постоянную степень окисления в своих соединениях проявляет

- 1) иод
- 2) хлор
- 3) бром
- 4) фтор

A9

1 2 3 4

A9. Верны ли следующие суждения о кислороде?

А. Кислород легко взаимодействует с азотом и фтором.
Б. Продукт взаимодействия кислорода и азота имеет формулу NO.

- 1) верно только А
- 2) верно только Б
- 3) верны оба суждения
- 4) оба суждения неверны

A10

1 2 3 4

A10. Оксид рубидия взаимодействует с:

- 1) азотом и водородом
- 2) водой и углекислым газом
- 3) серной кислотой и гидроксидом кальция
- 4) фосфором и аргоном

A11

1 2 3 4

A11. Хлороводородная кислота

- 1) относится к сильным электролитам
- 2) легко разлагается при кипячении на хлор и водород
- 3) не взаимодействует с алюминием
- 4) получается в промышленности из хлоридов кальция и калия

A12

1 2 3 4


A12. При нагревании разлагается без твердого остатка

- 1) KNO_3
- 2) NH_4NO_3
- 3) $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$
- 4) $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$

A13

1 2 3 4

A13. Для осуществления превращений в соответствии со схемой:



необходимо последовательно использовать

- 1) $\text{Ca}(\text{OH})_2$, Na_2CO_3 , HCl
- 2) $\text{Ca}(\text{OH})_2$, HCl, CaCO_3
- 3) Na_2O , CaCl_2 , HCl
- 4) Mg, HCl, CaCO_3

A14. Гомологами являются

- 1) пропан и пентан
- 2) пропан и циклопропан
- 3) пентан и пентен
- 4) циклопропан и пропен

1 2 3 4 A14

A15. В отличие от пропина, пропен не взаимодействует с

- 1) аммиачным раствором оксида серебра
- 2) бромной водой
- 3) раствором перманганата калия
- 4) хлороводородом

1 2 3 4 A15

A16. При нитровании фенола образуется

- 1) гексановая кислота
- 2) пикриновая кислота
- 3) пропионовая кислота
- 4) олеиновая кислота

1 2 3 4 A16


A17. Верны ли следующие суждения о мылах?

- А. К мылам относят, в частности, пальмитат натрия.
Б. Все мыла относятся к поверхностно-активным веществам.

- 1) верно только А
- 2) верно только Б
- 3) верны оба суждения
- 4) оба суждения неверны

1 2 3 4 A17

A18. В схеме превращений:



веществом X является

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1) бензиловый спирт | 3) бензол |
| 2) бензойная кислота | 4) стеариновая кислота |

1 2 3 4 A18

A19. К экзотермическим реакциям относится

- 1) взаимодействие муравьиной кислоты и гидроксида калия
- 2) взаимодействие азота и кислорода
- 3) гидролиз сульфата меди
- 4) разложение карбоната кальция

1 2 3 4 A19

A20. Для уменьшения скорости взаимодействия алюминия с хлором следует

- 1) уменьшить объем реакционного сосуда
- 2) уменьшить температуру
- 3) добавить катализатор
- 4) измельчить алюминий

1 2 3 4 A20

A21 1 2 3 4**A21.** К обратимым реакциям относится

- | | |
|---|--|
| 1) $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{NaOH} + \text{H}_2$ | 3) $\text{NH}_4\text{NO}_2 = \text{N}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ |
| 2) $\text{Fe} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{FeSO}_4 + \text{H}_2$ | 4) $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 = 2\text{NH}_3$ |

A22 1 2 3 4**A22.** Электролиты расположены в порядке увеличения степени диссоциации в ряду:

- | | |
|---|---|
| 1) HNO_2 , HNO_3 , $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ | 3) HCl , CH_3COOH , HClO_4 |
| 2) HNO_3 , H_2SO_4 , H_2SO_3 | 4) CH_3COOH , H_2SO_3 , H_2SO_4 |

A23 1 2 3 4**A23.** Краткое ионное уравнение

отвечает взаимодействию сульфида железа и

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1) соляной кислоты | 3) фтороводородной кислоты |
| 2) уксусной кислоты | 4) угольной кислоты |

A24 1 2 3 4**A24.** От коррозии железо защищают, покрывая его слоем

- | | |
|----------|-------------|
| 1) меди | 3) магния |
| 2) цинка | 4) алюминия |

A25 1 2 3 4**A25.** Одинаковую среду имеют водные растворы карбоната калия и

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1) хлорида натрия | 3) сульфита цезия |
| 2) нитрата железа (II) | 4) нитрата хрома (III) |

A26 1 2 3 4**A26.** Бутан может быть получен по реакции Вюрца, схема которой

- | |
|--|
| 1) $\text{C}_4\text{H}_8 \xrightarrow{t^\circ, \text{кат}} \rightarrow$ |
| 2) $\text{C}_4\text{H}_9\text{Cl} + \text{KOH}_{(\text{спиртовой})} \rightarrow$ |
| 3) $\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl} + \text{Na} \rightarrow$ |
| 4) $2\text{C}_2\text{H}_4 \xrightarrow{t^\circ, \text{кат}} \rightarrow$ |

A27 1 2 3 4**A27.** Этиленгликоль получается при

- | |
|---|
| 1) взаимодействию этена с перманганатом калия в водном растворе |
| 2) взаимодействию этилена с глицерином |
| 3) гидролизе этилхлорида |
| 4) взаимодействию этилена с бромной водой |

A28 1 2 3 4**A28.** Верны ли следующие суждения о качественных реакциях?

- А. И карбонат-ионы, и иодид-ионы можно обнаружить с помощью ионов кальция.
- Б. Жёлтый осадок образуется при действии ионов серебра на хлорид-ионы.

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1) верно только А | 3) верны оба суждения |
| 2) верно только Б | 4) оба суждения неверны |

1 2 3 4 A29

- 1 2 3 4 A30

1) 30,0 л 3) 70,0 л
2) 40,0 л 4) 26,7 л

B3

B3. Установите соответствие между формулой соли и продуктом, выделяющимся на аноде при электролизе водного раствора этого вещества.

ФОРМУЛА СОЛИ

АНОДНЫЙ ПРОДУКТ

А) KF

1) кислород

Б) K_2CO_3

2) галоген

В) $CuCl_2$

3) водород

Г) $KHSO_4$

4) сера

| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| | | | |

B4

B4. Установите соответствие между названием соли и средой ее водного раствора.

НАЗВАНИЕ СОЛИ

СРЕДА РАСТВОРА

А) гидрокарбонат калия

1) нейтральная

Б) гидрофосфат натрия

2) кислая

В) ортофосфат цезия

3) щелочная

Г) дигидрофосфат натрия

| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| | | | |

B5

B5. Установите соответствие между простыми веществами и формулами реагентов, с которыми они могут взаимодействовать.

ПРОСТОЕ ВЕЩЕСТВО

ФОРМУЛЫ РЕАГЕНТОВ

А) K

1) $H_2SO_{4(разб.)}$, Al

Б) Cl_2

2) H_2O , KI

В) P

3) C_2H_4 , O_2

Г) H_2

4) Cu, N_2

5) O_2 , Al

6) $H_2SO_{4(разб.)}$, S

| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ответом к заданиям B6–B8 является последовательность трех цифр, которые соответствуют номерам правильных ответов. Запишите эти цифры в порядке возрастания сначала в текст работы, а затем перенесите их в бланк ответов № 1 без пробелов и других символов.

B6

B6. Радикалами являются частицы

1) C_3H_7

4) Na_2

2) NO

5) Xe

3) C_5H_{12}

6) F

Ответ: _____.

В7. Вещество состава $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—CO—O—CH}_3$ будет реагировать с

- 1) углекислым газом
- 2) угольной кислотой
- 3) водой
- 4) хлором
- 5) гидроксидом бария
- 6) гидроксидом алюминия

Ответ: _____.

B7

В8. 3-хлор-2-аминопропановая кислота реагирует с

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1) NH_3 | 4) HBrO_4 |
| 2) Hg | 5) Si |
| 3) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ | 6) C_5H_{12} |

Ответ: _____.

B8

Ответом к заданиям В9, В10 является число. Запишите это число в текст работы, а затем перенесите его в бланк ответов № 1 без указания единиц измерения.

В9. При упаривании 300 г 5% -ного раствора сахарозы получили 245 г раствора с массовой долей _____ %.

(Запишите число с точностью до целых).

B9

В10. Масса железной окалины, которая образуется при сгорании 10,2 г железа, равна _____ г.

(Запишите число с точностью до целых).


B10

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1.

Часть 3

Для записи ответов к заданиям этой части (С1–С5) используйте бланк ответов № 2. Запишите сначала номер задания (С1 и т.д.), а затем полное решение. Ответы записывайте четко и разборчиво.

С1. Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции



Определите окислитель и восстановитель.


C1

C2

C2. Даны вещества: фосфор, иод, азотная кислота, вода. Напишите уравнения четырех возможных реакций между этими веществами.

C3

C3. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения:



C4

C4. Какую массу оксида хрома (VI) следует добавить к 275 г 10%-го раствора хромовой кислоты, чтобы увеличить ее массовую долю в полтора раза?

C5

C5. Установите молекулярную формулу предельной карбоновой кислоты, натриевая соль которой содержит 37,5% углерода.

ВАРИАНТ 6

Часть 1

При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под номером выполняемого вами задания (A1–A30) поставьте знак « x » в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа.

A1. Изотопами являются:

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1) алмаз и фуллерен | 3) водород-3 и гелий-3 |
| 2) кислород и озон | 4) дейтерий и тритий |

1 2 3 4 A1

A2. Наименьшим атомным радиусом обладает

- | | |
|---------|------------|
| 1) хлор | 3) аргон |
| 2) бром | 4) криптон |

1 2 3 4 A2

A3. Водородная связь не образуется между молекулами

- | | |
|--------------|------------|
| 1) пропанола | 3) аммиака |
| 2) ацетона | 4) воды |

1 2 3 4 A3

A4. Элемент, проявляющий постоянную степень окисления в своих соединениях:

- | | |
|---------|-------------|
| 1) хлор | 3) фтор |
| 2) сера | 4) кислород |

1 2 3 4 A4

A5. Молекулярное строение имеет

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1) иод | 3) гидроксид калия |
| 2) иодид калия | 4) гидроксид алюминия |

1 2 3 4 A5

A6. В перечне веществ

- | | |
|--------------|----------------|
| 1) метанол | 4) фенол |
| 2) бутанол-2 | 5) изопропанол |
| 3) бензол | 6) стирол |

1 2 3 4 A6

к одноатомным предельным спиртам относятся вещества, названия которых обозначены цифрами

- | | |
|----------|----------|
| 1) 1,3,4 | 3) 3,4,6 |
| 2) 1,2,5 | 4) 1,5,6 |

A7. Число неспаренных электронов в атоме бора в основном состоянии такое же, как и в атоме

- | | |
|------------|--------------|
| 1) рубидия | 3) кислорода |
| 2) кремния | 4) кальция |

1 2 3 4 A7

A8

1 2 3 4

A8. И азот, и фосфор

- 1) легко окисляются кислородом воздуха
- 2) образуют фториды состава ЭF_5
- 3) образуют водородные соединения ЭН_3 и ЭН_5
- 4) при нагревании взаимодействуют с активными металлами

A9

1 2 3 4

A9. Верны ли следующие суждения о сере?

- А. Сера легко взаимодействует с хлором и фтором.
Б. Продукт взаимодействия кислорода и серы имеет формулу SO_2
- 1) верно только А
 - 2) верно только Б
 - 3) верны оба суждения
 - 4) оба суждения неверны

A10

1 2 3 4

A10. Оксид магния взаимодействует с:

- 1) оксидом кремния
- 2) кремнием
- 3) бериллием
- 4) оксидом кальция

A11

1 2 3 4

A11. Гидроксид хлора (VII)

- 1) имеет формулу $\text{Cl}(\text{OH})_7$
- 2) образуется при взаимодействии хлора с водой
- 3) имеет кислотный характер
- 4) не проявляет окислительных свойств

A12


1 2 3 4

A12. Твердый остаток образуется при прокаливании соли

- 1) NH_4Cl
- 2) $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$
- 3) KNO_3
- 4) $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$

A13

1 2 3 4

A13. Для осуществления превращений в соответствии со схемой:

необходимо последовательно использовать

- 1) Ca , HCl
- 2) Ca , H_2O
- 3) Na , KOH
- 4) Mg , CaCO_3

A14

1 2 3 4

A14. Гомологами не являются

- 1) метанол и этанол
- 2) метилбензол и метилфенол
- 3) пропан и бутан
- 4) этаналь и пропионовый альдегид

A15

1 2 3 4

A15. В отличие от пропана, пропен

- 1) взаимодействует с хлором
- 2) окисляется кислородом
- 3) взаимодействует с аммиачным раствором оксида серебра
- 4) полимеризуется

A16. Фенол проявляет более сильные кислотные свойства по сравнению с

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1) уксусной кислотой | 3) метанолом |
| 2) угольной кислотой | 4) тринитрофенолом |

1 2 3 4 A16


A17. Верны ли следующие суждения о мылах?

А. Все мыла — вещества твёрдые.
Б. Мыла в промышленности получают исходя из глицерина.

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1) верно только А | 3) верны оба суждения |
| 2) верно только Б | 4) оба суждения неверны |

1 2 3 4 A17

A18. В схеме превращений:



веществом X является

- | | |
|------------|---------------------|
| 1) метан | 3) ацетон |
| 2) метанол | 4) уксусная кислота |

1 2 3 4 A18

A19. К эндотермическим реакциям относится

- 1) взаимодействие азота и кислорода
- 2) взаимодействие азота и водорода
- 3) взаимодействие кислорода и водорода
- 4) взаимодействие воды и оксида натрия

1 2 3 4 A19

A20. При обычных условиях с наибольшей скоростью протекает реакция:

- | | |
|--|---|
| 1) $\text{Ag}^+_{(\text{p-p})} + \text{Cl}^-_{(\text{p-p})}$ | 3) $\text{N}_2 + \text{O}_2$ |
| 2) $\text{Fe}_{(\text{тв.})} + \text{O}_2$ | 4) $\text{Cl}_2 + \text{Fe}_{(\text{тв.})}$ |

1 2 3 4 A20

A21. При увеличении давления наиболее сильно смещается равновесие в системе:

- 1) $\text{N}_2 + \text{O}_2 = 2\text{NO}$
- 2) $2\text{FeCl}_{2(\text{тв.})} + \text{Cl}_2 = 2\text{FeCl}_{3(\text{тв.})}$
- 3) $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 = 2\text{SO}_{3(\text{газ})}$
- 4) $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 = 2\text{NH}_3$


1 2 3 4 A21

A22. Сила электролитов увеличивается в ряду:

- | | |
|--|---|
| 1) HI, HBr, HF | 3) H ₂ O, H ₂ S, HI |
| 2) H ₂ O, HCl, H ₂ S | 4) KI, HI, HF |

1 2 3 4 A22

A23. Краткое ионное уравнение



отвечает взаимодействию карбоната кальция с

- 1) сероводородной кислотой
- 2) муравьиной кислотой
- 3) бензойной кислотой
- 4) иодоводородной кислотой

1 2 3 4 A23

A24 1 2 3 4**A24.** От коррозии железо защищают, покрывая его слоем

- | | |
|-------------|------------|
| 1) алюминия | 3) серебра |
| 2) олова | 4) магния |

A25 1 2 3 4**A25.** Одинаковую среду имеют водные растворы хлорида алюминия и

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1) хлорида натрия | 3) сульфита калия |
| 2) сульфата железа (II) | 4) нитрата кальция (II) |

A26 1 2 3 4**A26.** Среди циклоалканов наиболее реакционноспособным является

- | | |
|----------------|----------------|
| 1) циклобутан | 3) циклопентан |
| 2) циклопропан | 4) циклогексан |

A27 1 2 3 4**A27.** Этиленгликоль легко растворяет свежеполученный гидроксид

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1) меди (II) | 3) железа (II) |
| 2) алюминия | 4) железа (III) |

A28 1 2 3 4**A28.** Верны ли следующие суждения о качественных реакциях?

- А. Ионы серебра образуют с фосфат-ионами чёрный осадок.
Б. При действии соляной кислоты на сульфид-ионы выделяется газ без цвета и запаха.
- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1) верно только А | 3) верны оба суждения |
| 2) верно только Б | 4) оба суждения неверны |

A29 1 2 3 4**A29.** С химической точки зрения природная гуттаперча является

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1) полипропиленом | 3) полибутадиеном |
| 2) полиизопреном | 4) полистиролом |

A30 1 2 3 4**A30.** При полном сгорании 20 л (н.у.) аммиака в избытке кислорода образуется азот объемом

- | | |
|---------|---------|
| 1) 10 л | 3) 30 л |
| 2) 20 л | 4) 40 л |

Часть 2

Ответом к заданиям этой части (B1–B10) является набор цифр или число, которые следует записать в бланк ответов № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру и запятую в записи десятичной дроби пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке образцами.

В заданиях B1–B5 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных вами ответов, а затем получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк ответов № 1 без пробелов и других символов. (Цифры в ответе могут повторяться).

В1. Установите соответствие между формулой соли и группой, к которой она относится.

ФОРМУЛА СОЛИ

ГРУППА

А) $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$

1) средняя соль

Б) NaHCO_3

2) кислая соль

В) $(\text{CuOH})_2\text{SO}_4$

3) основная соль

Г) KH_2PO_4

| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| | | | |

В1

В2. Установите соответствие между формулой вещества и степенью окисления азота в ней.

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА

СТЕПЕНЬ ОКИСЛЕНИЯ АЗОТА

А) $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$

1) -3

Б) NO_2F

2) -2

В) NOCl

3) -1

Г) BaN_2O_2

4) +1

5) +3

6) +5

| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| | | | |

В2

В3. Установите соответствие между формулой соли и продуктом, выделяющимся на аноде при электролизе водного раствора этого вещества.

ФОРМУЛА СОЛИ

АНОДНЫЙ ПРОДУКТ

А) Na_2HPO_4

1) кислород

Б) SnCl_2

2) галоген

В) BeF_2

3) водород

Г) SnBr_4

4) фосфор

| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| | | | |

В3

В4. Установите соответствие между названием соли и средой ее водного раствора.

НАЗВАНИЕ СОЛИ

СРЕДА РАСТВОРА

А) гидросульфид калия

1) нейтральная

Б) гидросульфит натрия

2) кислая

В) ортофосфат калия

3) щелочная

Г) хлорид хрома (III)

| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| | | | |

В4

B5

B5. Установите соответствие между простыми веществами и формулами реагентов, с которыми они могут взаимодействовать.

ПРОСТОЕ ВЕЩЕСТВО

ФОРМУЛЫ РЕАГЕНТОВ

А) Br_2 1) $\text{H}_2\text{SO}_{4(\text{разб.})}$, Al Б) H_2 2) KOH , KI В) S 3) C_2H_4 , O_2 Г) Na 4) Cu , N_2 5) O_2 , Al 6) $\text{H}_2\text{SO}_{4(\text{разб.})}$, S

| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ответом к заданиям В6–В8 является последовательность трех цифр, которые соответствуют номерам правильных ответов. Запишите эти цифры в порядке возрастания сначала в текст работы, а затем перенесите их в бланк ответов № 1 без пробелов и других символов.

B6

B6. И *цис*-бутен-2, и *транс*-бутен-2

1) имеют состав C_4H_8

2) являются изомерами циклобутана

3) являются изомерами бутана

4) не обесцвечивают бромную воду

5) окисляются водным раствором перманганата калия

6) не способны к реакции полимеризации

Ответ: _____.

B7

B7. И глицерин, и уксусная кислота будут реагировать с

1) натрием

2) хлороводородом

3) гидроксидом алюминия

4) водородом

5) кислородом

6) гидроксидом меди (II)

Ответ: _____.

B8

B8. Верны следующие утверждения о белках:

1) белки гидролизуются до аминов

2) в макромолекулах белка присутствуют амидные связи

3) при гидролизе белков образуются аминокислоты

4) в макромолекулах белков существуют водородные связи

5) белки дают с азотной кислотой черное окрашивание

6) основная функция белков в организме — энергетическая

Ответ: _____.

Ответом к заданиям В9, В10 является число. Запишите это число в текст работы, а затем перенесите его в бланк ответов № 1 без указания единиц измерения.

- В9. При добавлении 300 г воды к 340 г 15% -ного раствора мальтозы получили раствор с массовой долей _____ %.

(Запишите число с точностью до целых.)

В9

- В10. Масса хлорида фосфора (V), который образуется при сгорании 3,1 г фосфора в атмосфере хлора, равна _____ г.

(Запишите число с точностью до десятых).

В10

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1.

Часть 3

Для записи ответов к заданиям этой части (С1–С5) используйте бланк ответов № 2. Запишите сначала номер задания (С1 и т.д.), а затем полное решение. Ответы записывайте четко и разборчиво.

- С1. Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции




Определите окислитель и восстановитель.

С1

- С2. Даны вещества: бром, фосфор, алюминий, водород. Напишите уравнения четырех возможных реакций между этими веществами.

С2

- С3. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения:



С3

- С4. Рассчитайте массовую долю серной кислоты в растворе, полученном смешением 200 мл 15% -ного раствора серной кислоты плотностью 1,2 г/мл и 150 мл 10% -ного раствора нитрата бария плотностью 1,04 г/мл.

С4

- С5. Установите молекулярную формулу простого эфира, если при сгорании 4,6 г его образуется 8,8 г углекислого газа и 5,4 г воды.

С5

ВАРИАНТ 7

Часть 1

При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под номером выполняемого вами задания (A1–A30) поставьте знак « x » в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа.

A1 1 2 3 4

A1. К s-элементам не относится:

- | | |
|----------|------------|
| 1) сера | 3) водород |
| 2) гелий | 4) кальций |

A2 1 2 3 4

A2. Кислотность оксидов, образованных элементами IVA-группы, сверху вниз

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1) не изменяется | 3) увеличивается |
| 2) изменяется периодически | 4) уменьшается |

A3 1 2 3 4

A3. Ионная связь реализуется в соединении

- | | |
|-----------|------------|
| 1) H_2O | 3) CO_2 |
| 2) CaO | 4) CrO_3 |

A4 1 2 3 4

A4. Валентность IV атом азота имеет в соединении

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1) HNO_2 | 3) NO |
| 2) $(NH_4)_2CO_3$ | 4) $Ca(NO_2)_2$ |

A5 1 2 3 4

A5. Немолекулярное строение имеет

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1) иод | 3) гидроксид калия |
| 2) хлорид иода (III) | 4) уксусная кислота |

A6 1 2 3 4

A6. В перечне веществ

- | | |
|------------|-------------|
| 1) метанол | 4) изобутан |
| 2) пропан | 5) декан |
| 3) бензол | 6) дивинил |

к предельным углеводородам относятся вещества, названия которых обозначены цифрами

- | | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| 1) 1,2,5 | 2) 2,4,5 | 3) 2,3,4 | 4) 2,5,6 |
|----------|----------|----------|----------|

A7 1 2 3 4

A7. Число неспаренных электронов в атоме меди в основном состоянии

- | | | | |
|------|------|------|------|
| 1) 1 | 2) 2 | 3) 3 | 4) 4 |
|------|------|------|------|

A8 1 2 3 4

A8. И сера, и кислород


- | |
|--|
| 1) легко окисляются фтором |
| 2) образуют фториды состава $ЭF_6$ |
| 3) образуют водородные соединения $ЭH_2$ |
| 4) при нагревании взаимодействуют с бромом |

A17 1 2 3 4**A17.** Верны ли следующие суждения об ацетальдегиде?

А. Ацетальдегид в промышленности получают гидратацией ацетиленов или каталитическим окислением этана.

Б. Ацетальдегид и этаналь разные вещества.

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1) верно только А | 3) верны оба суждения |
| 2) верно только Б | 4) оба суждения неверны |

A18 1 2 3 4**A18.** В схеме превращений:

веществом X является

- | | |
|-----------|---------------------|
| 1) этан | 3) ацетон |
| 2) этанол | 4) уксусная кислота |

A19 1 2 3 4**A19.** По радикальному механизму не протекает реакция между

- 1) азотом и кислородом
- 2) кислородом и водородом
- 3) изобутаном и бромом
- 4) водой и оксидом натрия

A20 1 2 3 4**A20.** При обычных условиях с наибольшей скоростью протекает реакция:

- 1) $\text{Ba}_{(\text{p-p})}^{2+} + \text{SO}_{(\text{p-p})} \rightarrow$
- 2) $\text{Al}_{(\text{тв.})} + \text{O}_2 \rightarrow$
- 3) $\text{N}_2 + \text{H}_2 \rightarrow$
- 4) $\text{Br}_{2(\text{жид.})} + \text{Sn}_{(\text{тв.})} \rightarrow$

A21 1 2 3 4**A21.** На состояние химического равновесия, как правило, не влияет:

- 1) изменение давления
- 2) изменение температуры
- 3) использование избытка реагентов
- 4) применение катализатора

A22 1 2 3 4**A22.** Электролитом, более сильным, чем уксусная кислота, является:

- 1) масляная кислота
- 2) фенол
- 3) муравьиная кислота
- 4) угольная кислота

A23 1 2 3 4**A23.** Взаимодействию карбоната кальция с иодоводородной кислотой отвечает краткое ионное уравнение

- 1) $\text{CO}_3 + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$
- 2) $\text{CaCO}_3 + 2\text{H}^+ + 2\text{I}^- \rightarrow \text{CaI}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$
- 3) $\text{CaCO}_3 + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{Ca}^{2+} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$
- 4) $\text{CaCO}_3 + 2\text{HI} \rightarrow \text{Ca}^{2+} + 2\text{I}^- + \text{H}_2\text{CO}_3$

- A24.** Алюминиевое изделие лучше всего скреплять заклепками, сделанными из
- | | |
|-------------|------------|
| 1) алюминия | 3) серебра |
| 2) меди | 4) магния |
- A25.** Наиболее сильно подвергаются гидролизу соли
- | | |
|----------------|-----------------|
| 1) натрия | 3) калия |
| 2) железа (II) | 4) железа (III) |
- A26.** Среди циклоалканов наименее реакционноспособным является
- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1) циклопропан | 3) 1,2-диметилциклобутан |
| 2) метилциклопропан | 4) циклогексан |
- A27.** В глицерине легко растворяется осадок гидроксида
- | | |
|-------------------|----------------|
| 1) железа (II) | 3) меди (II) |
| 2) алюминия (III) | 4) хрома (III) |
- A28.** Верны ли следующие суждения о качественных реакциях?
- А. При действии ионов серебра на фосфат-ионы образуется жёлтый осадок, растворимый в азотной кислоте.
- Б. Качественной реакцией на нитрат-ионы является взаимодействие их с медью в присутствии концентрированной серной кислоты.
- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1) верно только А | 3) верны оба суждения |
| 2) верно только Б | 4) оба суждения неверны |
- A29.** В качестве восстановителя при выплавке железа в промышленности наиболее часто используют
- | | |
|-------------|-----------|
| 1) водород | 3) натрий |
| 2) алюминий | 4) кокс |
- A30.** Для полного взаимодействия газообразные кислород и оксид азота (II) должны быть смешаны в объёмном соотношении
- | | |
|----------|----------|
| 1) 1 : 1 | 3) 2 : 1 |
| 2) 1 : 2 | 4) 1 : 4 |

1 2 3 4 A24

1 2 3 4 A25

1 2 3 4 A26

1 2 3 4 A27

1 2 3 4 A28

1 2 3 4 A29

1 2 3 4 A30

Часть 2

Ответом к заданиям этой части (B1–B10) является набор цифр или число, которые следует записать в бланк ответов № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру и запятую в записи десятичной дроби пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке образцами.

В заданиях B1–B5 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных вами ответов, а затем получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк ответов № 1 без пробелов и других символов. (Цифры в ответе могут повторяться.)

В1


В1. Установите соответствие между общей формулой гомологического ряда и представителем этого ряда.

ФОРМУЛА РЯДА


ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РЯДА




1) бензол



2) циклогексин



3) изобутан



4) пропин

5) циклобутан

6) стирол

| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| | | | |

В2


В2. Установите соответствие между формулой вещества и степенью окисления серы в ней.

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА


СТЕПЕНЬ ОКИСЛЕНИЯ СЕРЫ



1) -2



2) -1



3) +1



4) +4

5) +5

6) +6


| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| | | | |

В3

В3. Установите соответствие между формулой соли и продуктом, выделяющимся на катоде при электролизе водного раствора этого вещества.

ФОРМУЛА СОЛИ


КАТОДНЫЙ ПРОДУКТ




1) натрий



2) барий



3) алюминий



4) медь

5) водород

6) кислород

| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| | | | |

В4

В4. Установите соответствие между названием соли и ее способностью к гидролизу.

НАЗВАНИЕ СОЛИ

СПОСОБНОСТЬ К ГИДРОЛИЗУ

А) ацетат аммония

1) гидролизуется по катиону

Б) сульфид алюминия

2) гидролизуется по аниону

В) ортофосфат калия

3) гидролизуется и по катиону, и по аниону

Г) сульфат хрома (II)

4) не подвергается гидролизу

| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| | | | |

В5. Установите соответствие между веществами и формулами реагентов, с которыми они могут взаимодействовать.

ВЕЩЕСТВО

ФОРМУЛЫ РЕАГЕНТОВ

А) NaHSO_4

1) H_2SO_4 , BaCl_2 , $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$

Б) K_2SO_4

2) N_2 , H_2SO_4 , O_3

В) Li

3) N_2 , Ag , HCl

Г) O_2

4) N_2 , Pt , NH_3

5) SO_2 , P_2O_3 , CrO

6) KOH , CH_3COONa , Na

| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ответом к заданиям В6–В8 является последовательность трех цифр, которые соответствуют номерам правильных ответов. Запишите эти цифры в порядке возрастания сначала в текст работы, а затем перенесите их в бланк ответов № 1 без пробелов и других символов.

В6. И бутен-1, и циклобутан

1) являются изомерами бутена-2

2) имеют состав C_4H_8

3) не реагируют с аммиачным раствором оксида серебра

4) не обесцвечивают бромную воду

5) не окисляются водным раствором перманганата калия

6) не способны к реакции полимеризации

Ответ: _____.

В7. И этанол, и муравьиная кислота будут реагировать с

1) натрием

2) кислородом

3) гидроксидом алюминия

4) водородом

5) аммиаком

6) гидроксидом меди (II)

Ответ: _____.

В8. При гидролизе белков могут образоваться вещества:

1) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

2) CH_3COOH

3) $\text{NH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$

4) $\text{CH}_3\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$

5) $\text{CH}_2(\text{OH})\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$

6) NH_2-NH_2

Ответ: _____.

Ответом к заданиям В9, В10 является число. Запишите это число в текст работы, а затем перенесите его в бланк ответов № 1 без указания единиц измерения.

В9

- В9. При смешивании 1 кг воды и 2 кг 15% -ного раствора мочевины получится раствор с массовой долей мочевины _____ %.
(Запишите число с точностью до целых).

В10

- В10. Объем хлора (н.у.), необходимый для полного окисления 12,7 г хлорида железа (II), равен _____ л.
(Запишите число с точностью до сотых).

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1.

Часть 3

Для записи ответов к заданиям этой части (С1–С5) используйте бланк ответов № 2. Запишите сначала номер задания (С1 и т.д.), а затем полное решение. Ответы записывайте четко и разборчиво.

С1

- С1. Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции




Определите окислитель и восстановитель.

С2

- С2. Даны вещества: иод, железо, азотная кислота (конц.), водород. Напишите уравнения четырех возможных реакций между этими веществами.

С3

- С3. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения:



С4

- С4. Рассчитайте массовую долю азотной кислоты в растворе, полученном смешением 200 мл 15% -ного раствора серной кислоты плотностью 1,2 г/мл и 150 мл 10% -ного раствора нитрата бария плотностью 1,04 г/мл.

С5

- С5. Установите молекулярную формулу простого эфира, если при сгорании 6 г его образуется 6,72 л углекислого газа и 7,2 г воды.

ВАРИАНТ 8

Часть 1

При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под номером выполняемого вами задания (A1–A30) поставьте знак « x » в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа.

A1. Электронную конфигурацию $1s^2 2s^2$ имеет

- 1) атом гелия He
- 2) катион лития Li^+
- 3) катион азота N^{3+}
- 4) анион углерода C^{2-}

1 2 3 4 A1

A2. Окислительная активность атомов элементов растёт в ряду

- 1) кислород, фтор, неон
- 2) фосфор, сера, хлор
- 3) азот, кислород, сера
- 4) сера, хлор, бром

1 2 3 4 A2

A3. Наибольшая длина связи в молекуле

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1) CH_4 | 3) GeH_4 |
| 2) SiH_4 | 4) SnH_4 |

1 2 3 4 A3

A4. Степень окисления +1 атом хлора имеет в соединении

- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| 1) ClO_2 | 3) $\text{Ba}(\text{ClO}_2)_2$ |
| 2) HCl | 4) $\text{Ca}(\text{ClO})\text{Cl}$ |

1 2 3 4 A4

A5. Немолекулярное строение имеет

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1) цинк | 3) фтороводород |
| 2) муравьиная кислота | 4) кислород |

1 2 3 4 A5

A6. В перечне веществ

- 1) CO 2) CO_2 3) Na_2O 4) CaO 5) Al_2O_3 6) CrO

к основным оксидам относятся вещества, формулы которых обозначены цифрами

- | | |
|----------|----------|
| 1) 1,2,5 | 3) 1,4,5 |
| 2) 3,4,5 | 4) 3,4,6 |

1 2 3 4 A6

A7. И цинк, и магний

- 1) легко окисляются водой
- 2) образуют сильноамфотерные оксиды
- 3) имеют по два электрона на внешнем уровне
- 4) не взаимодействуют с бромной водой

1 2 3 4 A7

A8

1 2 3 4

A8. Характер высшего оксида теллура

- 1) кислотный
- 2) основной
- 3) амфотерный
- 4) несолеобразующий

A9

1 2 3 4

A9. Верны ли следующие суждения о сурьме?

А. Гидроксид сурьмы (V) относится к основным гидроксидам.
Б. Сурьма может взаимодействовать с активными металлами.

- 1) верно только А
- 2) верно только Б
- 3) верны оба суждения
- 4) оба суждения неверны

A10

1 2 3 4

A10. При нагревании легко разлагаются оксиды:

- 1) P_2O_5 и CaO
- 2) SO_3 и N_2O_5
- 3) BaO и CO_2
- 4) Fe_2O_3 и CO

A11

1 2 3 4

A11. Верны ли следующие суждения о сероводородной кислоте?

А. Сероводородная кислота относится к слабым электролитам.
Б. Сероводородная кислота может быть как окислителем, так и восстановителем.

- 1) верно только А
- 2) верно только Б
- 3) верны оба суждения
- 4) оба суждения неверны

A12


1 2 3 4

A12. В водных растворах кислых солей среда

- 1) всегда кислая
- 2) всегда щелочная
- 3) всегда нейтральная
- 4) может быть различной

A13

1 2 3 4

A13. Для осуществления превращений в соответствии со схемой:

необходимо последовательно использовать

- 1) кислород, углерод, хлор
- 2) перекись водорода, водород, хлор
- 3) кислород, водород, хлороводород
- 4) оксид кальция, литий, хлороводород

A14

1 2 3 4

A14. Основы теории строения органических соединений заложены в середине XIX в.

- 1) Д.И. Менделеевым
- 2) В.В. Марковниковым
- 3) А.М. Бутлеровым
- 4) С. Аррениусом

A15

1 2 3 4

A15. Тетраэдрическое окружение имеет атом углерода в молекуле

- 1) этана
- 2) этина
- 3) этилена
- 4) бензола

A16. Атомы углерода в молекуле фенола находятся в состоянии гибридизации

- | | |
|-----------|--------------|
| 1) sp | 3) sp^3 |
| 2) sp^2 | 4) sp^3d^2 |

1 2 3 4 A16

A17. Верны ли следующие суждения об углеводах?

- А. Рибоза и дезоксирибоза относятся к пентозам.
Б. Глюкоза даёт реакцию серебряного зеркала.

- 1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

1 2 3 4 A17

A18. В схеме превращений:



веществом X является

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1) пропан | 3) 1-бромпропан |
| 2) дибромпропан | 4) пропанон |

1 2 3 4 A18

A19. К окислительно-восстановительным реакциям относится:

- 1) $\text{C}_2\text{H}_6 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{Cl} + \text{HCl}$
2) $\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl} + \text{KOH} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \text{KCl}$
3) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \text{CH}_3\text{COOH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O}$
4) $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{NaOH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COONa} + \text{H}_2\text{O}$


1 2 3 4 A19

A20. При нагревании на каждые 10 °С скорость большинства реакций увеличивается

- | | |
|---------------|----------------|
| 1) на 50% | 3) в 10 раз |
| 2) в 2-4 раза | 4) в 15-20 раз |

1 2 3 4 A20

A21. Для смещения равновесия в сторону исходных веществ в системе



необходимо

- 1) увеличить температуру
2) увеличить давление
3) увеличить концентрацию хлора
4) уменьшить температуру

1 2 3 4 A21

A22. Практически необратимо в водном растворе диссоциирует

- 1) уксусная кислота
2) бромоводородная кислота
3) гидрат аммиака
4) пропионовая кислота

1 2 3 4 A22

A23


1 2 3 4

A23. Газ не выделяется в ходе реакций:

- 1) $K_2CO_3 + H_2SO_4 \rightarrow$
- 2) $K_2CO_3 + Ba(NO_3)_2 \rightarrow$
- 3) $NaHCO_3 + HI \rightarrow$
- 4) $K_2CO_3 + H_2O + AlCl_3 \rightarrow$

A24

1 2 3 4

A24. Коэффициент перед формулой окислителя в уравнении реакции

- | | |
|------|------|
| 1) 1 | 3) 3 |
| 2) 2 | 4) 8 |

A25

1 2 3 4

A25. Среда водного раствора карбоната цезия

- | | |
|------------------|----------------|
| 1) сильно кислая | 3) нейтральная |
| 2) слабо кислая | 4) щелочная |

A26

1 2 3 4

A26. Уксусная кислота из бутана может быть получена в результате реакции

- 1) каталитического восстановления
- 2) каталитического окисления
- 3) гидратации
- 4) этерификации

A27

1 2 3 4

A27. Верны ли следующие суждения о свойствах этанола?

- А. Этанол при нагревании окисляется оксидом меди.
В. Этанол может быть получен гидролизом крахмала.
- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1) верно только А | 3) верны оба суждения |
| 2) верно только В | 4) оба суждения неверны |

A28

1 2 3 4

A28. Верны ли следующие суждения о правилах безопасности в лаборатории?

- А. Озон относится к очень ядовитым газам.
Б. В лаборатории категорически запрещается пробовать вещества на вкус.
- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1) верно только А | 3) верны оба суждения |
| 2) верно только Б | 4) оба суждения неверны |

A29

1 2 3 4

A29. При первичной перегонке нефти не получают

- | | |
|------------|------------|
| 1) мазут | 3) этилен |
| 2) керосин | 4) газойль |

A30

1 2 3 4

A30. При взаимодействии 40 л кислорода и 40 л угарного газа останется в избытке

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1) 20 л угарного газа | 3) 10 л угарного газа |
| 2) 10 л кислорода | 4) 20 л кислорода |

Часть 2

Ответом к заданиям этой части (В1–В10) является набор цифр или число, которые следует записать в бланк ответов № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру и запятую в записи десятичной дроби пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке образцами.

В заданиях В1–В5 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных вами ответов, а затем получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк ответов № 1 без пробелов и других символов. (Цифры в ответе могут повторяться).

В1. Установите соответствие между формулой соединения и классом, к которому оно принадлежит.

ФОРМУЛА СОЕДИНЕНИЯ

КЛАСС СОЕДИНЕНИЙ

А) KNaCO_3

1) средние соли

Б) $(\text{CuOH})_2\text{CO}_3$

2) кислые соли

В) Zn(OH)_2

3) основные соли

Г) HCOOH

4) амфотерные гидроксиды

5) основания

6) кислоты

| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| | | | |

В1

В2. Установите соответствие между формулой соли и степенью окисления хрома в ней.

ФОРМУЛА СОЛИ

СТЕПЕНЬ ОКИСЛЕНИЯ ХРОМА

А) KCrO_3Cl

1) 0

Б) $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$

2) +2

В) CrOF

3) +3

Г) $\text{Na}_3[\text{Cr(OH)}_6]$

4) +4

5) +5

6) +6

| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| | | | |

В2

В3. Установите соответствие между названием металла и электролитическим способом его получения.

МЕТАЛЛ

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ

А) калий

1) электролиз водного раствора сульфата

Б) медь

2) электролиз расплавленного хлорида

В) хром

3) электролиз расплавленного нитрата

Г) кальций

4) электролиз водного раствора гидроксида

| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| | | | |

В3

B4

B4. Установите соответствие между названием соли и способностью ее к гидролизу.

НАЗВАНИЕ СОЛИ

- А) стеарат аммония
 Б) пальмитат калия
 В) перхлорат натрия
 Г) сульфат цезия

СПОСОБНОСТЬ К ГИДРОЛИЗУ

- 1) гидролизу не подвергается
 2) гидролизуеться по катиону
 3) гидролизуеться по аниону
 4) гидролизуеться по катиону и аниону

| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| | | | |

B5

B5. Установите соответствие между исходными веществами и основным продуктом их взаимодействия.

ФОРМУЛЫ ВЕЩЕСТВ

- А) $\text{Cr}(\text{OH})_3 + \text{CsOH}_{(\text{водн. р-р})}$
 Б) $\text{Cr}(\text{OH})_3 + \text{Cs}_2\text{O} \xrightarrow{\text{сплавл.}}$
 В) $\text{Cr}(\text{OH})_3 + \text{KOH} \xrightarrow{\text{сплавл.}}$
 Г) $\text{Cr}(\text{OH})_3 + \text{K}_2\text{CO}_3 \xrightarrow{\text{сплавл.}}$

ПРОДУКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

- 1) CsCrO_2
 2) $\text{Cs}_3[\text{Cr}(\text{OH})_6]$
 3) KCrO_2
 4) $\text{K}_3[\text{Cr}(\text{OH})_6]$

| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ответом к заданиям B6–B8 является последовательность трех цифр, которые соответствуют номерам правильных ответов. Запишите эти цифры в порядке возрастания сначала в текст работы, а затем перенесите их в бланк ответов № 1 без пробелов и других символов.

B6

B6. И бензол, и циклогексан

- 1) имеют плоское строение молекулы
 2) вступают в реакцию замещения с хлором
 3) легко присоединяют водород
 4) обесцвечивают водный раствор KMnO_4
 5) относятся к циклическим углеводородам
 6) сгорают на воздухе

Ответ: _____.

B7

B7. Уксусный альдегид может быть получен

- 1) окислением этанола
 2) каталитическим окислением этилена
 3) гидратацией ацетиленов
 4) гидрированием уксусной кислоты
 5) гидролизом солей уксусной кислоты
 6) дегидратацией уксусной кислоты

Ответ: _____.

B8. Как аминокислота, так и уксусная кислота

- 1) реагируют с кислотами
- 2) реагируют с аммиаком
- 3) являются жидкими при обычных условиях
- 4) обладают резким запахом
- 5) реагируют со спиртами
- 6) образуют соли с оксидами металлов

Ответ: _____.

Ответом к заданиям B9, B10 является число. Запишите это число в текст работы, а затем перенесите его в бланк ответов № 1 без указания единиц измерения.

B9. 500 г раствора с массовой долей соли 10% упаривали до тех пор, пока массовая доля соли не стала равной 14%. Масса выпаренной при этом воды составила _____ г.

(Запишите число с точностью до целых.)

B10. Объем ацетилена, который выделится при гидролизе 50 г карбида кальция, содержащего 8% примесей, равен _____ л (н.у.).


(Запишите число с точностью до десятых).

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1.

Часть 3

Для записи ответов к заданиям этой части (C1–C5) используйте бланк ответов № 2. Запишите сначала номер задания (C1 и т.д.), а затем полное решение. Ответы записывайте четко и разборчиво.


C1. Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции



Определите окислитель и восстановитель.

C2. Даны вещества: диоксид марганца, соляная кислота (конц.), хлорат калия, гидроксид цезия. Напишите уравнения четырех возможных реакций между этими веществами.

C3. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения:



C4

C4. Газ, выделившийся при взаимодействии 3,2 г меди с 100 мл 60%-ной азотной кислоты (плотностью 1,4 г/мл), растворили в 100 г 15%-ного раствора гидроксида натрия. Рассчитайте суммарную массовую долю солей в полученном растворе.

C5

C5. Установите молекулярную формулу органического соединения, если при сгорании 4,5 г его выделилось 1,12 л азота, 6,3 г воды и 4,48 л углекислого газа. Плотность паров соединения по водороду 22,5.

ВАРИАНТ 9

Часть 1

При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под номером выполняемого вами задания (A1–A30) поставьте знак « x » в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа.

A1. Электронная конфигурация $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ отвечает

- 1) атому аргона и атому хлора
- 2) атому аргона и атому калия
- 3) сульфид-иону и катиону лития
- 4) атому аргона и хлорид-иону

1 2 3 4 A1

A2. Кислотные свойства в ряду высших оксидов бора — углерода — кремния

- 1) возрастают
- 2) ослабевают
- 3) сначала возрастают, затем ослабевают
- 4) сначала ослабевают, затем возрастают

1 2 3 4 A2

A3. Одна из связей образована по донорно-акцепторному механизму в

- 1) молекуле озона
- 2) молекуле азота
- 3) молекуле кислорода
- 4) молекуле аммиака

1 2 3 4 A3

A4. Атом углерода образует три ковалентные связи в молекуле

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1) CO | 3) HCOOH |
| 2) CO ₂ | 4) CH ₃ Cl |

1 2 3 4 A4

A5. Наименьшую температуру плавления имеет

- 1) фторид кальция
- 2) оксид кальция
- 3) бром
- 4) оксид углерода (IV)

1 2 3 4 A5

A6. В перечне веществ

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1) CH ₃ COOCH ₃ | 4) (CH ₃) ₂ NH |
| 2) KClO ₃ | 5) NH ₄ NO ₃ |
| 3) Ba(OH) ₂ | 6) [CH ₃ NH ₃]Br |

к солям относятся вещества, формулы которых обозначены цифрами

- | | |
|------------|------------|
| 1) 2, 3, 5 | 3) 2, 5, 6 |
| 2) 1, 2, 4 | 4) 1, 2, 6 |

1 2 3 4 A6

A7

1 2 3 4

A7. Верны ли следующие суждения о натрии и его соединениях?

- А. Степень окисления натрия в высшем оксиде равна + 1.
Б. Кроме оксида, натрий образует и пероксид.

- 1) верно только А
- 2) верно только Б
- 3) верны оба суждения
- 4) оба суждения неверны

A8

1 2 3 4

A8. В соответствии с положением углерода в Периодической системе он может проявлять степени окисления

- | | |
|--------------|----------------|
| 1) только +4 | 3) -4, +2 и +4 |
| 2) только +2 | 4) -4 и +4 |

A9

1 2 3 4

A9. Верны ли следующие суждения о ксеноне?

- А. Ксенон относится к инертным газам.
Б. Из всех неметаллов ксенон может реагировать только с кислородом.

- 1) верно только А
- 2) верно только Б
- 3) верны оба суждения
- 4) оба суждения неверны

A10

1 2 3 4

A10. Амфотерность оксида свинца (II) подтверждается его способностью

- 1) растворяться в кислотах
- 2) восстанавливаться водородом
- 3) реагировать с оксидом кальция
- 4) взаимодействовать как с кислотами, так и с щелочами

A11

1 2 3 4

A11. Угольная кислота

- 1) относится к довольно сильным электролитам
- 2) разлагается в момент получения
- 3) растворяет металлическую медь
- 4) вытесняется из солей серной кислотой, но не вытесняется соляной

A12

1 2 3 4


A12. Двойной суперфосфат получают, обрабатывая фосфорит

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1) серной кислотой | 3) водой |
| 2) угольной кислотой | 4) фосфорной кислотой |

A13

1 2 3 4

A13. Для осуществления превращений в соответствии со схемой:



необходимо последовательно использовать

- 1) кислород, воду, соляную кислоту
- 2) кислород, азотную кислоту, воду
- 3) воду, кислород, хлорную воду
- 4) воду, кислород, воду

A14. Не является изомером 2-метилгексана

- | | |
|------------------|----------------------|
| 1) 3-метилгексан | 3) 2,2-диметилпентан |
| 2) 3-этилпентан | 4) 2-метилпентан |

1 2 3 4 A14

A15. Две π -связи имеются в молекуле

- | | |
|------------|----------------------|
| 1) толуола | 3) дивинила |
| 2) бензола | 4) метилциклопентена |

1 2 3 4 A15

A16. Этанол проявляет двойственные свойства, реагируя с

- 1) кислородом и фтором
- 2) калием и бромоводородом
- 3) бромоводородом и фтороводородом
- 4) натрием и литием

1 2 3 4 A16

A17. Верны ли следующие суждения об углеводах?

А. Глюкоза, в отличие от фруктозы, даёт реакцию серебряного зеркала.
Б. Сахароза относится к моносахаридам.

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1) верно только А | 3) верны оба суждения |
| 2) верно только Б | 4) оба суждения неверны |

1 2 3 4 A17

A18. В схеме превращений:

хлорбензол \rightarrow X \rightarrow пикриновая кислота

веществом X является

- | | |
|-----------|----------------|
| 1) бензол | 3) фенол |
| 2) толуол | 4) нитробензол |

1 2 3 4 A18

A19. Эндотермической окислительно-восстановительной реакцией является:

- 1) $\text{KMnO}_4 \rightarrow \text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{MnO}_2 + \text{O}_2$
- 2) $\text{N}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{NO}$
- 3) $\text{NO} + \text{O}_2 \rightarrow \text{NO}_2$
- 4) $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{KOH} \rightarrow \text{KHSO}_4 + \text{H}_2\text{O}$


1 2 3 4 A19

A20. Скорость реакции не зависит от

- 1) концентрации реагирующих веществ
- 2) концентрации продуктов реакции
- 3) температуры
- 4) наличия катализатора

1 2 3 4 A20

A21. В системе



смещение равновесия в сторону продукта реакции будет происходить при

- | | |
|---------------------------|---|
| 1) увеличении температуры | 3) увеличении концентрации SO_2Cl_2 |
| 2) увеличении давления | 4) уменьшении концентрации SO_2 |

1 2 3 4 A21


A22 1 2 3 4**A22.** Уравнением электролитической диссоциации является

- 1) $\text{HCl} \rightarrow \text{H}_2 + \text{Cl}_2$
- 2) $\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$
- 3) $\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{OH}^-$
- 4) $\text{PBr}_5 \rightleftharpoons \text{PBr}_3 + \text{Br}_2$

A23 1 2 3 4**A23.** Краткое ионное уравнение

отвечает взаимодействию

- 1) хлорида алюминия и гидроксида меди
- 2) сульфата алюминия и гидроксида лития
- 3) фосфата алюминия и гидроксида калия
- 4) нитрата алюминия и гидрата аммиака

A24 1 2 3 4**A24.** Коэффициент перед формулой восстановителя в уравнении реакции

равен

- | | |
|------|------|
| 1) 1 | 3) 3 |
| 2) 2 | 4) 4 |

A25 1 2 3 4**A25.** Среда водного раствора гидрокарбоната натрия такая же, как и водного раствора

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1) дигидрофосфата калия | 3) сульфата калия |
| 2) сульфида лития | 4) хлорида алюминия |

A26 1 2 3 4**A26.** Изобутан взаимодействует с

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1) соляной кислотой | 3) бромоводородом |
| 2) водородом | 4) азотной кислотой |

A27 1 2 3 4**A27.** Этиленгликоль образуется при

- 1) окислении этилена раствором перманганата калия
- 2) окислении этана кислородом
- 3) гидролизе бромэтана в щелочной среде
- 4) взаимодействии 1,2-дихлорэтана со спиртовым раствором щелочи

A28 1 2 3 4**A28.** Верны ли следующие суждения о качественных реакциях на сульфид-ионы?

А. С солями свинца сульфид-ионы дают чёрный осадок.

Б. При действии серной кислоты на сульфид-ионы выделяется газ с характерным неприятным запахом.

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1) верно только А | 3) верны оба суждения |
| 2) верно только Б | 4) оба суждения неверны |

A29. В основе первичной переработки нефти лежит

- 1) крекинг нефти
- 2) перегонка нефти
- 3) дегидроциклизация углеводородов
- 4) риформинг углеводородов

1 2 3 4 **A29**

A30. Теплота образования хлороводорода из простых веществ равна 92 кДж/моль. Количество теплоты, выделившееся при взаимодействии 10 л (н.у.) хлора и 5 л (н.у.) водорода, равно

- 1) 92 кДж
- 2) 41 кДж
- 3) 46 кДж
- 4) 10 кДж

1 2 3 4 **A30**

Часть 2

Ответом к заданиям этой части (B1–B10) является набор цифр или число, которые следует записать в бланк ответов № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру и запятую в записи десятичной дроби пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке образцами.

В заданиях B1–B5 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных вами ответов, а затем получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк ответов № 1 без пробелов и других символов. (Цифры в ответе могут повторяться).

B1. Установите соответствие между названием органического соединения и общей формулой его гомологического ряда.

B1

НАЗВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ

ОБЩАЯ ФОРМУЛА РЯДА

А) метилбензол

1) $C_n H_{2n+2}$

Б) 2,2-диметилпентан

2) $C_n H_{2n}$

В) циклогексен

3) $C_n H_{2n-2}$

Г) 1,1-диметилциклогексан

4) $C_n H_{2n-4}$

5) $C_n H_{2n-6}$

| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| | | | |

B2

B2. Установите соответствие между схемой реакции и формулой окислителя в ней.

СХЕМА РЕАКЦИИ

- А) $\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{SO}_3$
 Б) $\text{SO}_2 + \text{H}_2\text{S} \rightarrow \text{S} + \text{H}_2\text{O}$
 В) $\text{SO}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{SO}_2\text{Cl}_2$
 Г) $\text{K}_2\text{SO}_3 \rightarrow \text{K}_2\text{S} + \text{K}_2\text{SO}_4$

ФОРМУЛА ОКИСЛИТЕЛЯ

- 1) O_2
 2) SO_2
 3) H_2S
 4) K_2SO_3
 5) Cl_2

| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| | | | |

B3

B3. Установите соответствие между формулой вещества и продуктом, выделяющимся на аноде при электролизе водного раствора этого вещества.

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА

- А) KI
 Б) AgF
 В) FeCl_2
 Г) KHCO_3

АНОДНЫЙ ПРОДУКТ

- 1) кислород
 2) металл
 3) иод
 4) фтор
 5) углекислый газ
 6) хлор

| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| | | | |

B4

B4. Установите соответствие между названием соли и средой ее водного раствора.

НАЗВАНИЕ СОЛИ

- А) пальмитат калия
 Б) пропионат натрия
 В) хлорид сурьмы (III)
 Г) фторид цезия

СРЕДА РАСТВОРА

- 1) нейтральная
 2) кислая
 3) щелочная

| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| | | | |

B5

B5. Установите соответствие между исходными веществами и продуктами их взаимодействия.

ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА

- А) $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow$
 Б) $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{CO}_3 \rightarrow$
 В) $\text{Na}_3\text{PO}_4 + \text{H}_2\text{CO}_3 \rightarrow$
 Г) $\text{Na} + \text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow$

ПРОДУКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

- 1) $\text{Na}_3\text{PO}_4 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$
 2) $\text{NaH}_2\text{PO}_4 + \text{Na}_2\text{CO}_3$
 3) $\text{Na}_3\text{PO}_4 + \text{H}_2$
 4) $\text{NaH}_2\text{PO}_4 + \text{H}_2$
 5) NaHCO_3
 6) $\text{Na}_2\text{HPO}_4 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$

| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ответом к заданиям В6–В8 является последовательность трех цифр, которые соответствуют номерам правильных ответов. Запишите эти цифры в порядке возрастания сначала в текст работы, а затем перенесите их в бланк ответов № 1 без пробелов и других символов.

В6. В отличие от бутена-1, пропин-1

- 1) образует метилацетиленид меди
- 2) с водой образует альдегид
- 3) взаимодействует с бромной водой
- 4) реагирует с аммиачным раствором оксида серебра
- 5) не имеет изомеров
- 6) при гидратации дает кетон

Ответ: _____.

В6

В7. Сложный эфир образуется при взаимодействии

- 1) глицерина и азотной кислоты
- 2) целлюлозы и уксусной кислоты
- 3) муравьиной кислоты и изопропилового спирта
- 4) уксусной кислоты и соды
- 5) глицерина и аммиака
- 6) аминокислоты и гидроксида меди

Ответ: _____.

В7

В8. Щелочную среду имеют водные растворы

- 1) C_2H_5OH
- 2) $C_2H_4(OH)_2$
- 3) NH_2CH_2COOH
- 4) NH_2NH_2
- 5) NH_2CH_3
- 6) CH_3NHCH_3

Ответ: _____.

В8

Ответом к заданиям В9, В10 является число. Запишите это число в текст работы, а затем перенесите его в бланк ответов № 1 без указания единиц измерения.

В9. При упаривании 345 г 10%-ного раствора калийной селитры получился раствор с содержанием соли 14%. Масса выпаренной воды при этом составила _____ г. (Запишите число с точностью до десятых.)

В9

В10. Объем кислорода, который необходим для полного сжигания 4,6 г диметилового эфира, равен _____ л (н.у.). (Запишите число с точностью до сотых.)

В10


Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1.

Часть 3

Для записи ответов к заданиям этой части (С1–С5) используйте бланк ответов № 2. Запишите сначала номер задания (С1 и т.д.), а затем полное решение. Ответы записывайте четко и разборчиво.

С1

- С1. Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции




Определите окислитель и восстановитель.

С2

- С2. Даны вещества: сульфид калия, медный купорос, азотная кислота, сера. Напишите уравнения четырех возможных реакций между этими веществами.

С3

- С3. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения:



С4

- С4. Смешали 200 г 10% -ного раствора хлорида меди(II) и 200 г 5% -ного раствора сульфида калия. Определите массовую долю хлорида калия в растворе.

С5

- С5. Установите молекулярную формулу предельной карбоновой кислоты, метиловый эфир которой содержит 9,09% водорода.

ВАРИАНТ 10

Часть 1

При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под номером выполняемого вами задания (A1–A30) поставьте знак « x » в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа.

A1. Одинаковую электронную конфигурацию имеют частицы

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1) Cl и Ar | 3) Cl^- и F^- |
| 2) Cl^- и Ar | 4) Na^+ и Ar |

1 2 3 4 A1

A2. Наименьшим атомным радиусом обладает

- | | |
|---------|-----------|
| 1) фтор | 3) иод |
| 2) неон | 4) ксенон |

1 2 3 4 A2

A3. Только неполярные ковалентные связи присутствуют в молекулах

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1) водорода и воды | 3) кислорода и аммиака |
| 2) хлора и хлороводорода | 4) водорода и кислорода |

1 2 3 4 A3

A4. Свою максимальную степень окисления азот проявляет в соединении

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1) NH_4Cl | 3) NH_4NO_3 |
| 2) NO_2 | 4) NOF |

1 2 3 4 A4

A5. Электролитами могут быть соединения с кристаллическими решетками

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1) атомной и молекулярной | 3) молекулярной и ионной |
| 2) ионной и атомной | 4) металлической и атомной |

1 2 3 4 A5

A6. В перечне веществ

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1) тринитроглицерин | 4) нитробензол |
| 2) 2,4,6-тринитротолуол | 5) нитрометан |
| 3) динитроцеллюлоза | 6) динитрат этиленгликоля |

1 2 3 4 A6

к нитросоединениям относятся вещества, названия которых обозначены цифрами

- | | |
|----------|----------|
| 1) 1,3,4 | 3) 1,4,5 |
| 2) 2,4,5 | 4) 3,5,6 |

A7. Атом алюминия

- | |
|--|
| 1) имеет больший радиус, чем атом магния |
| 2) содержит 1 неспаренный электрон |
| 3) содержит 1 внешний электрон |
| 4) более электроотрицателен, чем кремний |

1 2 3 4 A7

A8

1 2 3 4

A8. Наибольшую химическую активность имеет

- 1) сера
- 2) хлор
- 3) бром
- 4) иод

A9

1 2 3 4

A9. Верны ли следующие суждения о барии?

А. Барий активно реагирует с водой.

Б. Оксид бария может реагировать с кислородом с образованием пероксида.

- 1) верно только А
- 2) верно только Б
- 3) верны оба суждения
- 4) оба суждения неверны

A10

1 2 3 4

A10. Оксид хрома (III) может реагировать с:

- 1) углеродом и оксидом кальция
- 2) углеродом и водой
- 3) водой и оксидом серы (VI)
- 4) гидроксидом калия и водой

A11

1 2 3 4

A11. Силикагель образуется при

- 1) сгорании кремния на воздухе
- 2) взаимодействии кремния и щелочи
- 3) взаимодействии силиката калия и воды
- 4) высушивании геля кремниевой кислоты

A12


1 2 3 4

A12. Как правило, хорошо растворимы все соли

- 1) кальция
- 2) магния
- 3) азотной кислоты
- 4) фосфорной кислоты

A13

1 2 3 4

A13. В схеме превращений:

веществами X и Y могут быть

- | | |
|---|--|
| 1) $\text{Zn}(\text{OH})_2$ и Zn | 3) $\text{Zn}(\text{OH})_2$ и ZnCl_2 |
| 2) ZnCl_2 и ZnF_2 | 4) $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2$ и $\text{Zn}(\text{OH})_2$ |

A14

1 2 3 4

A14. Под химическим строением органических веществ понимают

- 1) валентные возможности атомов
- 2) порядок соединения атомов друг с другом
- 3) геометрическую форму молекулы
- 4) валентные углы в молекуле вещества

A15. И в алкенах, и в алкинах

- 1) все атомы углерода находятся в sp^2 -гибридном состоянии
- 2) присутствуют π -связи в молекулах
- 3) отсутствуют σ -связи
- 4) все связи углерод-углерод имеют одну постоянную длину

1 2 3 4 A15

A16. Атом кислорода в молекуле диметилового эфира образует

- 1) одну π -связь
- 2) одну π -связь и одну σ -связь
- 3) две π -связи
- 4) две σ -связи

1 2 3 4 A16


A17. Верны ли следующие суждения об углеводах?

- А. И сахароза, и глюкоза дают реакцию серебряного зеркала.
Б. Целлюлоза, в отличие от глюкозы, может гидролизироваться.

- 1) верно только А
- 2) верно только Б
- 3) верны оба суждения
- 4) оба суждения неверны

1 2 3 4 A17

A18. В схеме превращений:



веществом X является

- 1) пальмитиновая кислота
- 2) бензойная кислота
- 3) бензол
- 4) бензиловый спирт

1 2 3 4 A18

A19. К экзотермическим реакциям относится

- 1) разложение тринитроглицерина
- 2) разложение карбоната бария
- 3) разложение аммиака на простые вещества
- 4) взаимодействие азота и кислорода

1 2 3 4 A19

A20. С наибольшей скоростью происходит взаимодействие порошка железа с

- 1) фтором
- 2) хлором
- 3) бромом
- 4) иодом

1 2 3 4 A20

A21. Увеличение температуры приводит к смещению химического равновесия в сторону

- 1) прямой реакции
- 2) обратной реакции
- 3) эндотермической реакции
- 4) экзотермической реакции

1 2 3 4 A21

A22 1 2 3 4**A22.** Формула сильного и слабого электролита, соответственно,

- 1) HNO_2 и HNO_3
- 2) HNO_3 и H_2SO_4
- 3) HCl и CH_3COOH
- 4) CH_3COOH и H_2SO_3

A23 1 2 3 4**A23.** Краткое и полное ионные уравнения совпадают для реакции

- 1) соляной кислоты и карбоната калия
- 2) уксусной кислоты и карбоната кальция
- 3) уксусной кислоты и едкого натра
- 4) угольной кислоты и едкого натра

A24 1 2 3 4**A24.** Для так называемой «протекторной защиты» железное изделие соединяют проводником с

- | | |
|------------|------------|
| 1) медью | 3) магнием |
| 2) железом | 4) свинцом |

A25 1 2 3 4**A25.** Одинаковую окраску метиловый оранжевый будет иметь в водных растворах нитрата натрия и

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1) хлорида кальция | 3) сульфита цезия |
| 2) нитрата алюминия | 4) сульфида лития |

A26 1 2 3 4**A26.** И циклопропан, и пропан

- 1) присоединяют водород
- 2) присоединяют бромоводород
- 3) реагируют с бромной водой
- 4) реагируют с бромом

A27 1 2 3 4**A27.** При нагревании этилового спирта с серной кислотой в зависимости от условий возможно образование

- 1) CH_3COOH и CH_3CHO
- 2) CH_3COOH и $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{O}$
- 3) $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{O}$ и C_2H_4
- 4) C_2H_4 и CH_3COOH

A28 1 2 3 4**A28.** Верны ли следующие суждения о качественных реакциях?

- А. Гидроксид меди (II) может быть использован для обнаружения этанола.
- Б. Карбоновые кислоты не взаимодействуют с аммиачным раствором оксида серебра.

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1) верно только А | 3) верны оба суждения |
| 2) верно только Б | 4) оба суждения неверны |

A29. Структурным звеном полипропилена является

1 2 3 4 **A29**

- 1) $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}_2$
- 2) $-\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}_2-$
- 3) $-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2-$
- 4) $-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_3$

A30. Теплота образования 1 моль оксида магния из простых веществ равна 590 кДж. При взаимодействии 24 г магния и 5,6 л (н.у.) кислорода выделится теплота количеством

1 2 3 4 **A30**

- 1) 590 кДж
- 2) 295 кДж
- 3) 1180 кДж
- 4) 118 кДж

Часть 2

Ответом к заданиям этой части (В1–В10) является набор цифр или число, которые следует записать в бланк ответов № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру и запятую в записи десятичной дроби пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке образцами.

В заданиях В1–В5 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных вами ответов, а затем получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк ответов № 1 без пробелов и других символов. (Цифры в ответе могут повторяться).

В1. Установите соответствие между тривиальным и систематическим названиями соединений.

В1

**ТРИВИАЛЬНОЕ
НАЗВАНИЕ**

**СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ
НАЗВАНИЕ**


- А) глицерин
- Б) о-ксилол
- В) дивинил
- Г) изобутан

- 1) метилпропан
- 2) этандиол
- 3) пропантриол
- 4) 1,2-диметилбензол
- 5) 1,3-диметилбензол
- 6) бутадие-н-1,3


| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| | | | |

B2


B2. Установите соответствие между схемой реакции и названием восстановителя в ней.

СХЕМА РЕАКЦИИ**ВОССТАНОВИТЕЛЬ**


1) кальций



2) водород



3) аммиак



4) азот

5) хлор

| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| | | | |

B3

B3. Установите соответствие между названием металла и промышленным электролитическим способом его получения.

МЕТАЛЛ**СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ**

A) кальций

1) электролиз водного раствора хлорида

Б) серебро

2) электролиз водного раствора нитрата

В) натрий

3) электролиз расплавленного нитрата

Г) свинец

4) электролиз расплавленного хлорида

| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| | | | |

B4

B4. Установите соответствие между двумя солями, отношение которых к гидролизу одинаковое.

ПЕРВАЯ СОЛЬ**ВТОРАЯ СОЛЬ**

A) сульфат натрия

1) сульфид калия

Б) хлорид алюминия

2) сульфид алюминия

В) ортофосфат цезия

3) сульфат железа (II)

Г) ацетат аммония

4) нитрат бария

| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| | | | |

B5

B5. Установите соответствие между простыми веществами и формулами реагентов, с которыми они могут взаимодействовать.

ПРОСТОЕ ВЕЩЕСТВО**ФОРМУЛЫ РЕАГЕНТОВ**

A) Al

1) $\text{H}_2\text{SO}_{4(\text{разб.})}$, P

Б) Br_2

2) H_3PO_4 , CH_4

В) S

3) C_2H_4 , O_2

Г) H_2

4) Cu, N_2

5) O_2 , Al

6) KI, Cl_2

| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ответом к заданиям В6–В8 является последовательность трех цифр, которые соответствуют номерам правильных ответов. Запишите эти цифры в порядке возрастания сначала в текст работы, а затем перенесите их в бланк ответов № 1 без пробелов и других символов.

В6. Для получения метана можно использовать реакции:

- 1) нагревание ацетата калия с гидроксидом калия
- 2) разложение этена при нагревании
- 3) гидролиз карбида алюминия
- 4) нагревание хлорметана с натрием
- 5) восстановления метаналя
- 6) водорода с углеродом

Ответ: _____.

В6

В7. Этилацетат

- 1) гидролизуется под действием водных растворов щелочей
- 2) не используется как растворитель
- 3) образуется в ходе реакции этерификации
- 4) горит на воздухе
- 5) взаимодействует с бромом с образованием бромистого этила
- 6) получается в ходе реакции гидролиза

Ответ: _____.

В7

В8. При гидролизе белков могут образоваться:

- | | |
|----------------|------------------|
| 1) полипептиды | 4) глицин |
| 2) глицерин | 5) этиленгликоль |
| 3) этанол | 6) аминокислоты |

Ответ: _____.

В8

Ответом к заданиям В9, В10 является число. Запишите это число в текст работы, а затем перенесите его в бланк ответов № 1 без указания единиц измерения.

В9. При добавлении 50 мл 60%-ной серной кислоты (плотностью 1,6 г/мл) к 250 г 20%-ной серной кислоты получили раствор с массовой долей ____ %. (Запишите число с точностью до целых).

В9

В10. Масса пероксида натрия, образующегося при полном окислении 10 г натрия, равна _____ г. (Запишите число с точностью до целых).

В10


Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1.

Часть 3

Для записи ответов к заданиям этой части (С1–С5) используйте бланк ответов № 2. Запишите сначала номер задания (С1 и т.д.), а затем полное решение. Ответы записывайте четко и разборчиво.

С1

- С1. Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции




Определите окислитель и восстановитель.

С2

- С2. Даны вещества: натрий, иод, сероводородная кислота, уксусная кислота. Напишите уравнения четырех возможных реакций между этими веществами.

С3

- С3. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения:



С4

- С4. Рассчитайте массовую долю нитрата калия в растворе, полученном при растворении в 500 г 10%-ного раствора KOH всего оксида азота (IV), который выделится при нагревании 33,1 г нитрата свинца (II).

С5

- С5. Установите молекулярную формулу алкина, содержащего 12,19% водорода.

ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ

Часть 1

Задание с выбором ответа считается выполненным верно, если учащийся указал код правильного ответа. Во всех остальных случаях (выбран другой ответ; выбрано два или больше ответов, среди которых может быть и правильный; ответ на вопрос отсутствует) задание считается невыполненным.

Ответы к заданиям части 1

| Задание | Вариант | | | | | | | | | |
|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| A2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| A3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| A4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| A5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| A6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| A7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| A8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| A9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| A10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| A11 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| A12 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| A13 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| A14 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| A15 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| A16 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| A17 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| A18 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| A19 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| A20 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| A21 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| A22 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| A23 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| A24 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| A25 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| A26 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| A27 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| A28 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| A29 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| A30 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |

Часть 2

Задание с кратким свободным ответом считается выполненным верно, если правильно указана последовательность цифр (число).

За полный правильный ответ на задания В1–В8 ставится 2 балла, за правильный неполный — 1 балл, за неверный ответ (или при его отсутствии) — 0 баллов.

За правильный ответ на задания В9 и В10 ставится 1 балл, за неверный ответ — 0 баллов.

Ответы к заданиям части 2

| Задание | Вариант | | | | | | | | | |
|---------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| В1 | 3434 | 6125 | 2641 | 2643 | 4356 | 1232 | 3541 | 1346 | 5132 | 3461 |
| В2 | 6645 | 6663 | 2326 | 2245 | 2635 | 1654 | 6463 | 6633 | 1254 | 1123 |
| В3 | 3243 | 3234 | 1161 | 1161 | 1121 | 1212 | 5554 | 2112 | 3161 | 4242 |
| В4 | 4331 | 3114 | 2231 | 2233 | 3332 | 3232 | 3321 | 4311 | 3323 | 4312 |
| В5 | 2122 | 2133 | 6354 | 2164 | 6253 | 2356 | 6125 | 2133 | 6524 | 1653 |
| В6 | 125 | 456 | 145 | 126 | 126 | 125 | 123 | 256 | 146 | 136 |
| В7 | 256 | 145 | 235 | 146 | 345 | 156 | 125 | 123 | 123 | 134 |
| В8 | 134 | 125 | 256 | 134 | 134 | 234 | 345 | 256 | 456 | 146 |
| В9 | 14 | 13,8 | 77,5 | 30,5 | 6 | 8 | 10 | 143 | 98,6 | 30 |
| В10 | 291 | 8 | 9 | 4,5 | 14 | 20,9 | 1,12 | 16,1 | 6,72 | 17 |

Часть 3

За выполнение заданий С1 ставится от 0 до 3 баллов; за задания С2, С4 — от 0 до 4 баллов; за задание С3 — от 0 до 5 баллов, С5 ставится от 0 до 2 баллов.



Особо отмечаем, что задания части С могут быть выполнены разными способами. Здесь, в качестве образца, приведен один из возможных вариантов решения. Возможны и другие варианты решения, правильность которых должны определить эксперты-экзаменаторы на месте проведения и проверки экзаменационных работ.

В качестве типичного случая укажем на использование экзаменуемыми метода полуреакций (электронно-ионного метода) при подборе коэффициентов в задании С1. Использование этого метода вместо упрощенного метода электронного баланса не должно привести к снижению оценки за задание С1. В качестве другого типичного случая укажем на отклонение ответа в задании С4 от приведённого на несколько десятых долей процента. Так, вместо $w = 17,21\%$ экзаменуемые могут *при абсолютно правильных рассуждениях* получить ответ $w = 17,45\%$. Это, как правило, связано с различным округлением промежуточных результатов *и не должно приводить* в итоге к снижению выставяемой экспертом оценки.

Решения и ответы к заданиям части 3





Вариант 2

C1








Бром в степени окисления -1 является восстановителем, а марганец $+7$ (или перманганат калия за счет марганца $+7$) – окислителем.

C2



C3



C4



$$\omega(\text{NaNO}_2) = 3,3\%$$

C5

Формула вторичного амина — $\text{HN}(\text{C}_2\text{H}_5)(\text{CH}_3)$

Вариант 3

C1



Сера в степени окисления $+4$ является восстановителем, а хром $+6$ (или дихромат калия за счет хрома $+6$) — окислителем.

C2

- 1) $2\text{MgCl}_2 + 2\text{K}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow (\text{MgOH})_2\text{CO}_3\downarrow + 4\text{KCl} + \text{CO}_2\uparrow$
- 2) $\text{MgCl}_2 + 2\text{LiOH} \rightarrow \text{Mg}(\text{OH})_2\downarrow + 2\text{LiCl}$
- 3) $\text{K}_2\text{CO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow 2\text{KCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2\uparrow$
- 4) $\text{LiOH} + \text{HCl} = \text{LiCl} + \text{H}_2\text{O}$

C3

- 1) $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{NaOH} \longrightarrow \text{CH}_3\text{COONa} + \text{H}_2\text{O}$
- 2) $2\text{CH}_3\text{COONa} + 2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{электролиз}} \text{C}_2\text{H}_6\uparrow + 2\text{CO}_2\uparrow + \text{H}_2\uparrow + 2\text{NaOH}$
- 3) $\text{C}_2\text{H}_6 + \text{Cl}_2 \xrightarrow{\text{свет}} \text{C}_2\text{H}_5\text{Cl} + \text{HCl}$
- 4) $\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl} + \text{KOH}_{(\text{спиртов.})} \xrightarrow{t^\circ} \text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2\uparrow + \text{KCl} + \text{H}_2\text{O}$
- 5) $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2 + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{кат.}} \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

C4


$$m(\text{SO}_3) = 121,2 \text{ г.}$$

C5

Формула кислоты HCOOH

Вариант 4

C1



Фосфор в степени окисления -3 является восстановителем, а марганец $+7$ (или перманганат калия) – окислителем.

C2

- 1) $3\text{S} + 6\text{NaOH} \rightarrow 2\text{Na}_2\text{S} + \text{Na}_2\text{SO}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$
- 2) $\text{S} + 6\text{HNO}_3 \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4 + 6\text{NO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
- 3) $\text{NaOH} + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{NaNO}_3 + \text{H}_2\text{O}$
- 4) $3\text{NaOH} + \text{H}_3\text{PO}_4 = \text{Na}_3\text{PO}_4 + 3\text{H}_2\text{O}$

C3

- 1) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH} \xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4, t^\circ} \text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- 2) $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}_2 + \text{Br}_2 \rightarrow \text{CH}_3-\text{CHBr}-\text{CH}_2\text{Br}$
- 3) $\text{CH}_3-\text{CHBr}-\text{CH}_2\text{Br} + 2\text{KOH}_{(\text{спиртов.})} \xrightarrow{t^\circ} \text{CH}_3-\text{C}\equiv\text{CH} + 2\text{KBr} + 2\text{H}_2\text{O}$
- 4) $\text{CH}_3-\text{C}\equiv\text{CH} + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{Hg}^{2+}} (\text{CH}_3)_2\text{CO}$
- 5) $(\text{CH}_3)_2\text{CO} + \text{H}_2 \xrightarrow{\text{кат.}} (\text{CH}_3)_2\text{CH}-\text{OH}$

C4



$$m(\text{SeO}_3) = 17,8 \text{ г.}$$

C5

Формула кислоты C_2H_5COOH .




Вариант 5

C1








Азот в степени окисления -3 является восстановителем, а бром $+7$ (или пербромат калия) – окислителем.

C2



C3



C4



$$m(CrO_3) = 13,3 \text{ г.}$$

C5

Формула кислоты C_2H_5COOH .

Вариант 6

C1



Сера в степени окисления -2 является восстановителем, а бром $+7$ (или пербромат калия) – окислителем.

C2

- 1) $2P + 3Br_2 = 2PBr_3$
- 2) $2Al + 3Br_2 = 2AlBr_3$
- 3) $Br_2 + H_2 = 2HBr$
- 4) $Al + P = AlP$

C3

- 1) $CH_4 + Br_2 \xrightarrow{\text{свет, } t^\circ} CH_3Br + HBr$
- 2) $2CH_3Br + 2Na \xrightarrow{t^\circ} CH_3-CH_3 + 2NaBr$
- 3) $CH_3-CH_3 \xrightarrow{t^\circ, \text{кат.}} CH_2=CH_2 + H_2$
- 4) $CH_2=CH_2 + O_2 \xrightarrow{\text{кат.}} CH_3COH$
- 5) $CH_3COH + H_2 \xrightarrow{\text{кат.}} CH_3CH_2OH$

C4


$w(H_2SO_4) = 7,9\%$.

C5

Формула эфира $(CH_3)_2O$.

Вариант 7

C1





Азот в степени окисления +2 является восстановителем, а бром +7 (или бромная кислота) – окислителем.

C2

- 1) $Fe + I_2 \xrightarrow{t^\circ} FeI_2$
- 2) $I_2 + 10HNO_3 \xrightarrow{t^\circ} 2HIO_3 + 10NO_2 + 4H_2O$
- 3) $I_2 + H_2 \xrightleftharpoons{t^\circ, \text{кат.}} 2HI$
- 4) $Fe + 6HNO_3 \xrightarrow{t^\circ} Fe(NO_3)_3 + 3NO_2 + 3H_2O$

C3

- 1) $CH_2Cl-CH_2Cl + 2KOH_{(\text{спиртов.})} \xrightarrow{t^\circ} CH\equiv CH + 2KCl + 2H_2O$
- 2) $3CH\equiv CH \xrightarrow{t^\circ, \text{кат.}} C_6H_6$
- 3) $C_6H_6 + CH_3Cl \xrightarrow{t^\circ, \text{кат.}} C_6H_5-CH_3 + HCl$



C4



$$w(\text{HNO}_3) = 2\%.$$

C5

Формула эфира $\text{CH}_3\text{--O--C}_2\text{H}_5$.




Вариант 8

C1








Бром в степени окисления -1 является восстановителем, а бром $+7$ (или бромная кислота) — окислителем.

C2



C3



C4



$$w(\text{NaNO}_3 \text{ и } \text{NaNO}_2) = 7,4\%.$$

C5

Формула $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$.




Вариант 9

C1







Магний является восстановителем, а азот +5 (или нитрат-ион) – окислителем.

C2



C3



C4


$$w(\text{KCl}) = 3,5\%$$

C5










Формула кислоты $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$.

Вариант 10

C1



Фосфор –3 является восстановителем, а бром +5 (или бромноватая кислота) – окислителем.

C2**C3****C4**

$$w(\text{KNO}_3) = 2\%.$$

C5

Формула алкина C_6H_{10}

РЕШЕНИЯ ЗАДАНИЙ ВАРИАНТА 1

ВАРИАНТ 1

Часть 1

A1. Число электронов в ионе Ca^{2+} равно

- | | |
|-------|-------|
| 1) 18 | 3) 22 |
| 2) 20 | 4) 40 |

Решение. Число электронов в атоме равно порядковому номеру элемента в Периодической системе Д.И. Менделеева. Следовательно, в атоме кальция 20 электронов. Ион Ca^{2+} образуется при отдаче двух электронов атомом кальция, поэтому число электронов в ионе Ca^{2+} равно $20 - 2 = 18$.

Ответ: 1.

A2. Среди элементов второй группы максимальный радиус атома имеет

- | | |
|-------------|-----------|
| 1) бериллий | 3) кадмий |
| 2) барий | 4) цинк |

Решение. В главной подгруппе сверху вниз атомный радиус возрастает с одновременным увеличением числа электронных слоёв в атоме. Бериллий — элемент второго периода, барий — элемент шестого периода, поэтому атомный радиус бария больше, чем у бериллия. Цинк и кадмий — элементы побочных подгрупп, причем цинк находится в четвёртом периоде, а кадмий в пятом. Атомные радиусы и цинка и кадмия меньше, чем у бария.

Ответ: 2.

A3. Соединения с ионной связью расположены в ряду:

- 1) F_2 , KCl , NO_2 , NH_3
- 2) NH_4Cl , LiBr , CaO , BaF_2
- 3) CaF_2 , CaSO_4 , H_2O , NH_4F
- 4) NaNO_3 , HF , NF_3 , ZnO

Решение. Ионная связь реализуется в двух случаях. Во-первых, в бинарных соединениях, образованных типичным (активным) металлом и типичным неметаллом, например KCl , LiBr , CaF_2 . В этом случае разность в значениях электроотрицательностей достаточна для образования ионной связи. Во-вторых, ионная связь реализуется между сложными (составными) ионами, например в соединениях NH_4Cl (есть сложные ионы аммония NH_4^+ и хлорид-ионы Cl^-) или NaNO_3 (есть ионы натрия Na^+ и сложные нитрат-анионы NO_3^-). Следовательно, ионная связь имеется во всех соединениях второго ряда.

Ответ: 2.

A4. Степень окисления +2 атом углерода имеет в соединении

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| 1) CO_2 | 3) HCOOH |
| 2) CBr_4 | 4) CH_3COOH |

Решение. В представленных соединениях углерод имеет разные степени окисления, а именно: +4 (в CO_2 и CBr_4), +2 (в молекуле муравьиной кислоты HCOOH), -3 и +3 (в молекуле уксусной кислоты CH_3COOH).

Ответ: 3.

А5. Немолекулярное строение имеет

- | | |
|-------------|-------------------|
| 1) фуллерен | 3) вода |
| 2) алмаз | 4) углекислый газ |

Решение. Фуллерен — новая аллотропная модификация углерода — состоит из отдельных молекул C_{60} и C_{70} , т.е. имеет молекулярное строение. Молекулярное строение имеют также вода и углекислый газ. Они состоят, соответственно, из молекул H_2O и CO_2 . Методом исключения приходим к выводу, что немолекулярное строение имеет алмаз. Действительно, высокая твёрдость и высокая температура плавления алмаза свидетельствуют о немолекулярной природе этого удивительного вещества. Кристаллическая решетка алмаза — координационная (атомная).

Ответ: 2.


А6. В перечне веществ

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1) Mn_2O_7 | 4) CaO |
| 2) MgO | 5) Cl_2O_7 |
| 3) Cl_2O | 6) CrO |

к основным оксидам относятся вещества, формулы которых обозначены цифрами

- | | |
|----------|----------|
| 1) 1,2,4 | 3) 1,2,6 |
| 2) 2,4,5 | 4) 2,4,6 |

Решение. Как вам известно из школьного курса химии, все оксиды делятся на две группы — оксиды солеобразующие и несолеобразующие (или безразличные). Солеобразующие оксиды, в свою очередь, делят на кислотные, основные и амфотерные:



Если кислотные оксиды образованы как элементами-неметаллами, так и элементами-металлами, то основные оксиды образованы только металлами, причём в невысоких степенях окисления (как правило, +1, +2). Несомненно, что только основными свойствами обладают окси-

ды самых активных металлов — щелочных и щелочно-земельных (например Li_2O , Na_2O , K_2O , CaO , BaO). По своим свойствам к щелочно-земельным металлам примыкает магний, поэтому его оксид MgO также является основным. Также принимают за основные оксиды CuO , FeO , CrO и некоторые другие. Итак, формулы основных оксидов следует искать среди оксидов металлов.

Проанализируем предложенные варианты ответов. Mn_2O_7 хотя и образован элементом-металлом, однако содержит марганец в очень высокой степени окисления (+7), поэтому этот оксид кислотный (так, он взаимодействует с водой с образованием марганцевой кислоты HMnO_4). С образованием характерных кислот реагируют с водой и оксиды неметалла хлора — Cl_2O образует при этом хлорноватую кислоту HClO , а Cl_2O_7 образует сильную хлорную кислоту HClO_4 .

Остаются оксиды магния, кальция, хрома. Они действительно являются основными оксидами, которым отвечают гидроксиды — основания.

Ответ: 4.

A7. В порядке усиления металлических свойств элементы расположены в ряду:

- 1) калий, медь, рубидий
- 2) натрий, калий, медь
- 3) медь, рубидий, серебро
- 4) медь, калий, рубидий

Решение. В представленном списке есть действительно активные металлы (калий, натрий, рубидий), а есть и такие неактивные как медь и серебро. Понятно, что ответы 2 и 3 не могут быть правильными (медь и серебро — неактивные металлы). В первом варианте ответа между двумя активными металлами помещена медь, и только в последнем варианте ответа металлы расположены в порядке усиления активности — от самой неактивной меди к активному калию и очень активному рубидию.

Ответ: 4.

A8. Формула высшего оксида селена

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| 1) SeO | 3) SeO_3 |
| 2) SeO_2 | 4) Se_2O_7 |

Решение. Высшим называют оксид в степени окисления, равной номеру группы, в которой расположен элемент. Селен — элемент VI группы. Поэтому высшим оксидом будет оксид селена (VI): SeO_3 .

Ответ: 3.

A9. Верны ли следующие суждения о меди и её соединениях?

- А. Гидроксид меди (II) относится к кислотным гидроксидам.
Б. Медь практически не растворяется в разбавленной серной кислоте.

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1) верно только А | 3) верны оба суждения |
| 2) верно только Б | 4) оба суждения неверны |

Решение. $\text{Cu}(\text{OH})_2$ является слабоамфотерным гидроксидом с преобладанием основных свойств, поэтому первое утверждение неверно. Поскольку медь относится к малоактивным металлам, она, действительно не растворяется в разбавленных кислотах-неокислителях. Второе утверждение верно.

Ответ: 2.

A10. Оксид калия взаимодействует с каждым из двух веществ:

- 1) масляная кислота и вода
- 2) уксусная кислота и водород
- 3) оксид натрия и сера
- 4) оксид кальция и серная кислота

Решение. Оксид калия относится к основным оксидам. Поэтому он должен взаимодействовать с кислотами, кислотными оксидами, а также с водой (т.к. образован активным щелочным металлом). Оксид калия будет реагировать с масляной кислотой и водой, и не будет реагировать с водородом, оксидами натрия и кальция, с серой.

Ответ: 1.

A11. С гидроксидом хрома (III) не взаимодействует

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1) хлорная кислота | 3) гидроксид калия |
| 2) кислород | 4) гидроксид натрия |


Решение. Гидроксид хрома относится к амфотерным, поэтому возможны его реакции с кислотами и щелочами (ответы 1, 3, 4). А вот кислородом он окисляться не будет (в принципе, $\text{Cr}(\text{OH})_3$ может быть окислен до степени окисления хрома +6, но только более сильными окислителями, чем кислород).

Ответ 2.

A12. Раствор гидрокарбоната калия выделяет углекислый газ при действии на него


- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1) хлорида натрия | 3) любой щелочи |
| 2) угольной кислоты | 4) уксусной кислоты |

Решение. Гидрокарбонат калия — соль угольной кислоты. Все соли угольной кислоты выделяют углекислый газ в кислой среде из-за неустойчивости образующейся угольной кислоты. В данном случае происходит процесс:



Ответ: 4.

A13. Для осуществления превращений в соответствии со схемой:



необходимо последовательно использовать

- 1) хлор и водород
- 2) хлорид натрия и водород
- 3) хлороводород и цинк
- 4) соляную кислоту и калий

Решение. Хлорид алюминия можно получить из гидроксида либо действием хлороводорода, либо соляной кислоты. Таким образом, правильный ответ следует выбирать из двух последних вариантов. Поскольку лишь калий может выделить алюминий из расплавленного хлорида, то правильным следует признать ответ 4.

Ответ: 4.

A14. Изомерия невозможна для

- | | |
|-------------------|------------|
| 1) 2-метилгексана | 3) пропана |
| 2) циклопропана | 4) пропена |

Решение. Изомеры существуют для 2-метилгексана (например, гептан), для циклопропана (например, пропен), для пропена (например, циклопропан). И только у пропана нет ни одного изомера — существует только одно вещество с формулой C_3H_8 .

Ответ: 3.

A15. Только один из атомов углерода находится в состоянии sp^3 -гибридизации в молекуле

- 1) этана
- 2) ацетилен
- 3) пропина
- 4) циклопропана


Решение. В молекуле этана 2 атома углерода, и оба они находятся в sp^3 -гибридном состоянии. В молекуле ацетилена нет ни одного атома углерода в sp^3 -гибридном состоянии (оба атома — в sp -гибридном состоянии). В молекуле циклопропана 3 атома углерода и все они находятся в sp^3 -гибридном состоянии. И лишь в молекуле пропина $CH_3-C\equiv CH$ один атом углерода находится в sp^3 -гибридном состоянии, в то время как два других — в sp -гибридном состоянии.

Ответ: 3.

A16. Для метанола возможна химическая реакция с

- 1) пропионовой кислотой
- 2) пропаном
- 3) углекислым газом
- 4) гидроксидом железа (II)

Решение. Метанол, как и все другие одноатомные спирты, не реагирует с алканами, углекислым газом, гидроксидами d -металлов. А вот реакция с карбоновыми кислотами (реакция этерификации) вполне возможна:



Ответ: 1.


A17. Верны ли следующие суждения о свойствах сахарозы?

- А. Раствор сахарозы не проводит электрический ток.
Б. При гидролизе сахарозы образуются глюкоза и фруктоза.
- 1) верно только А
 - 2) верно только Б
 - 3) верны оба суждения
 - 4) оба суждения неверны

Решение. Оценим правильность первого суждения. Как известно, к электролитам относятся кислоты, основания и соли. Сахароза — органическое вещество, относящееся к классу углеводов, следовательно, сахароза не является электролитом и поэтому её водный раствор не проводит электрический ток. Первое суждение верно. Что касается второго суждения, то глюкоза, будучи дисахаридом, состоящим из остатков глюкозы и фруктозы, при гидролизе способна расщепляться с образованием именно этих моносахаридов. Следовательно, второе утверждение также верно.

Ответ: 3.

A18. В схеме превращений:



веществом «X» является

- | | |
|---------------|---------------------|
| 1) метанол | 3) диметиловый эфир |
| 2) нитрометан | 4) дибромметан |


Решение. Ни диметиловый эфир, ни дибромметан не приведут к одностадийному получению метиламина. Остаются первые два варианта ответа. Действительно, и из метанола, и из нитрометана можно в одну стадию получить метиламин. Однако, метанол из метана в одну стадию не получается. Поэтому правильным следует признать второй ответ.

Ответ: 2.


A19. К реакциям замещения относится взаимодействие

- 1) пропена и воды
- 2) пропена и водорода
- 3) пропена и хлора при комнатной температуре
- 4) пропена и хлора при 600 °C

Решение. Проанализируем предложенные варианты ответов. В первом случае происходит присоединение воды к пропену с образованием пропанола-2. Во втором случае также происходит реакция присоединения, в результате которой образуется пропан. В третьем случае хлор также присоединяется по двойной связи к молекуле пропена и образуется 1,2-дихлорпропан:



И лишь в четвертом случае происходит реакция замещения — при столь высокой температуре происходит не присоединение хлора по двойной связи, а радикальное замещение атома водорода в метильной группе:



Ответ: 4.


A20. К каталитическим процессам относится реакция между

- 1) натрием и водой
- 2) бутеном-1 и водой
- 3) оксидом кальция и водой
- 4) оксидом меди (II) и водородом

Решение. Все реакции, кроме второй, не требуют присутствия катализатора.

Ответ: 2.

A21. Для смещения равновесия в сторону продукта реакции в системе



необходимо

- 1) увеличить температуру
- 2) уменьшить давление
- 3) уменьшить концентрацию водорода
- 4) уменьшить температуру

Решение. При ответе на этот вопрос следует вспомнить принцип смещения химического равновесия (Ле-Шателье, Браун): если на систему, находящуюся в состоянии равновесия, оказывать внешнее воздействие, то равновесие смещается в сторону, ослабляющую это воздействие. Увеличение температуры приведёт к смещению равновесия в сторону эндотермического процесса, т.е. влево. Уменьшение давления приведет к смещению равновесия в сторону реакции, идущей с увеличением объёма, т.е. влево. Уменьшение концентрации водорода сместит равновесие в сторону его образования, т.е. влево. И только уменьшение температуры будет способствовать смещению равновесия вправо, в сторону образования продукта реакции.

Ответ: 4.

A22. Электрический ток не проводят водные растворы

- 1) хлорида калия и гидроксида кальция
- 2) этанола и хлороводорода
- 3) пропанола и ацетона
- 4) глюкозы и ацетата калия


Решение. Этот вопрос можно перефразировать так: «Укажите названия неэлектролитов». Только неэлектролиты перечислены в ответе 3. Именно водные растворы пропилового спирта и ацетона не проводят электрический ток.

Ответ: 3.

A23. Осадок образуется при взаимодействии водных растворов

- | | |
|--|---|
| 1) KCl и $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ | 3) CaCO_3 и HCl |
| 2) $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ и $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ | 4) AlCl_3 и $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ |

Решение. При ответе на этот вопрос следует воспользоваться стандартной таблицей растворимости, которой можно пользоваться и на экзамене. Легко видно, что только во втором случае возможно образование нерастворимого сульфата бария:



Во всех остальных случаях осадка не образуется.

Ответ: 2.

A24. Восстановительные свойства не характерны для

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1) оксида азота (IV) | 3) водорода |
| 2) алюминия | 4) оксида углерода (II) |


Решение. Среди предложенных в ответе веществ только алюминий способен проявлять исключительно восстановительные свойства. Остальные вещества могут быть как восстановителями, так и окислителями. Для водорода и оксида углерода более характерны восстановительные свойства. Именно как сильные восстановители они и используются в промышленности при выделении металлов из руд. Другое дело оксид азота (IV). Он может быть как восстановителем, так и окислителем, но окислительные свойства его намного сильнее выражены по сравнению с восстановительными. Так, в атмосфере диоксида азота горят сера и фосфор, смесь его с водородом взрывается при нагревании и т.д. Следовательно, правильным следует считать ответ 1.

Ответ: 1.

A25. Кислую реакции среды имеет водный раствор

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1) нитрата кальция | 3) хлорида алюминия |
| 2) хлорида стронция | 4) сульфата цезия |

Решение. Кислую реакцию среды имеют средние соли, образованные слабым основанием и сильной кислотой. В списке ответов такая соль есть — это хлорид алюминия. Следовательно, среда его раствора — кислая:




Ответ: 3.


A26. Бутан в лаборатории можно получить при взаимодействии

- 1) метилбутана и водорода
- 2) карбида алюминия и воды
- 3) метана и пропана
- 4) хлорэтана и натрия

Решение. Проанализируем предложенные варианты ответов. Метилбутан с водородом в принципе не реагирует (ответ 1). Невозможна также реакция между метаном и пропаном (ответ 3). Карбид алюминия с водой реагирует, однако при этом образуется не бутан, а метан:



Итак, остаётся только четвёртый вариант ответа. Действительно, при взаимодействии хлорэтана с натрием образуется бутан (реакция Вюрца):




Ответ: 4.

A27. Этанол в промышленности получают

- 1) гидролизом $\text{C}_2\text{H}_5\text{OK}$
- 2) гидролизом $\text{C}_2\text{H}_5\text{—COO—C}_2\text{H}_5$
- 3) гидролизом $\text{C}_2\text{H}_5\text{—O—C}_2\text{H}_5$
- 4) гидратацией $\text{CH}_2=\text{CH}_2$

Решение. Действительно, во всех этих реакциях может получиться этанол. Однако, в промышленности его получают последним способом — гидратацией этилена:



И этилат калия, и этилпропионат, и диэтиловый эфир — слишком дорогое сырьё для получения этанола. Наоборот, все эти вещества получают исходя из этанола.

Ответ: 4.

A28. Верны ли следующие суждения о правилах обращения с веществами?

- А. Перманганат калия относится к пожаробезопасным веществам.
Б. При получении раствора серной кислоты следует всегда добавлять воду к концентрированной кислоте.
- 1) верно только А
 - 2) верно только Б
 - 3) верны оба суждения
 - 4) оба суждения неверны

Решение. Обсудим правильность приведённых в условии суждений. Перманганат калия KMnO_4 за счёт $\text{Mn}(+VII)$ является сильным окислителем, способным окислять как неорганические, так и органические вещества. Так, смеси KMnO_4 со многими органическими веществами способны самовоспламеняться. Следовательно, перманганат калия (обычная «марганцовка») относится к довольно опасным в пожарном отношении веществам. Поэтому суждение А неверно. Неверным следует признать и суждение Б. При растворении серной кислоты в воде выделяется столь большое количество теплоты, что вода нагревается до кипения, в результате чего сернокислотный раствор может выплеснуться из сосуда. Поэтому при растворении серной кислоты следует кислоту тонкой струйкой вливать в воду при непрерывном помешивании.

Ответ: 4.


А29. Одним из важнейших способов получения фенола является выделение его из продуктов

- 1) брожения глюкозы
- 2) коксования каменного угля
- 3) гидролиза целлюлозы
- 4) перегонки мазута

Решение. Естественно, фенол получают из продуктов коксования каменного угля. Во всех остальных процессах он не образуется.

Ответ: 2.

А30. Согласно термохимическому уравнению реакции



при нейтрализации 4 г едкого натра соляной кислотой выделится энергия количеством

- 1) 57 кДж
- 2) 570 кДж
- 3) 5,7 кДж
- 4) 0,57 кДж

Решение. Для начала переведём массу едкого натра в количество вещества: $n(\text{NaOH}) = m/M = 4/40 = 0,1$ моль. Очевидно, что если при нейтрализации 1 моль щелочи выделяется 57 кДж теплоты, то при нейтрализации 0,1 моль щелочи выделится в 10 раз меньше теплоты, т.е. 5,7 кДж.

Ответ: 3.

Часть 2

В1. Установите соответствие между названием органического соединения и классом, к которому оно принадлежит.

| НАЗВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ | КЛАСС СОЕДИНЕНИЙ |
|---------------------|------------------------------------|
| А) метанол | 1) простые эфиры |
| Б) стирол | 2) сложные эфиры |
| В) глицерин | 3) предельные спирты |
| Г) дивинил | 4) углеводороды |
| | 5) предельные карбоновые кислоты |
| | 6) ненасыщенные карбоновые кислоты |

Решение. Что касается метанола и глицерина, то их формулы знают все и все знают их принадлежность к классу спиртов. Сложнее обстоит дело со стиролом и дивинилом. Вот их формулы: $C_6H_5-CH=CH_2$ и $CH_2=CH-CH=CH_2$. Теперь всё ясно, это углеводороды.

Ответ: 3434.

В2. Установите соответствие между формулой соли и степенью окисления углерода в ней.

| ФОРМУЛА СОЛИ | СТЕПЕНЬ ОКИСЛЕНИЯ УГЛЕРОДА |
|------------------|----------------------------|
| А) K_2CO_3 | 1) -4 |
| Б) $Ca(HCO_3)_2$ | 2) -2 |
| В) $HCOONa$ | 3) 0 |
| Г) $NaHC_2O_4$ | 4) +2 |
| | 5) +3 |
| | 6) +4 |

Решение. Для решения необходимо вспомнить, что такие элементы как калий, кальций и натрий проявляют постоянную степень окисления (+1, +2, +1, соответственно). Кислород, как правило, имеет степень окисления -2. Водород, как правило, +1. Поскольку сумма всех степеней окисления равна нулю, то в первом соединении углерод должен иметь степень окисления +4, во втором также +4, в третьем +2, в последнем +3. Покажем на последнем примере, как найти степень окисления углерода. Обозначим её как q . Тогда, с учётом выше сказанного, можем записать:

$$1 + 1 + 2q + 4 \cdot (-2) = 0$$

$$2q - 6 = 0$$

$$q = +3$$

Ответ: 6645.

В3. Установите соответствие между формулой вещества и продуктом, выделяющимся на катоде при электролизе водного раствора этого вещества.

| ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА | КАТОДНЫЙ ПРОДУКТ |
|------------------|---------------------|
| А) K_2CO_3 | 1) кислород |
| Б) $AgNO_3$ | 2) только металл |
| В) $ZnCl_2$ | 3) только водород |
| Г) $NaHC_2O_4$ | 4) металл и водород |
| | 5) азот |
| | 6) хлор |

Решение. Вспомните, что на катоде могут выделяться: только металл, только водород, и металл и водород. От чего это зависит? В первую очередь, от положения металла в ряду напряжений. Если металл расположен в ряду напряжений правее водорода, то на катоде выделяется, как правило, сам металл. Если металл расположен в ряду напряжений левее марганца, то вместо металла выделяется водород из воды. В промежуточных случаях возможно образование как металла, так и водорода. Используя это правило и ряд напряжений металлов (выдаётся на экзамене), можно догадаться, что в первом случае вместо калия на катоде выделится водород, во втором случае — серебро, в третьем случае возможно образование и цинка и водорода, в последнем случае выделится только водород.

Ответ: 3243.

В4. Установите соответствие между названием соли и способностью её к гидролизу.

| НАЗВАНИЕ СОЛИ | СПОСОБНОСТЬ К ГИДРОЛИЗУ |
|--------------------|--------------------------------------|
| А) сульфид аммония | 1) гидролизу не подвергается |
| Б) фосфат калия | 2) гидролизуется по катиону |
| В) сульфид натрия | 3) гидролизуется по аниону |
| Г) сульфат цезия | 4) гидролизуется по катиону и аниону |

Решение. Способность к гидролизу определяется природой соли. Не гидролизуются соли, образованные сильным основанием и сильной кислотой. Все остальные соли гидролизуются. Возможны 3 случая гидролиза:

— если соль образована сильным основанием и слабой кислотой, гидролизу подвергается только анион соли,

— если соль образована слабым основанием и сильной кислотой, гидролизу подвергается катион соли,

— если соль образована слабым основанием и слабой кислотой, гидролизуются и катион, и анион.

Определим теперь природу предложенных солей.

Сульфид аммония $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ образован слабым основанием (NH_3) и слабой кислотой (H_2S).

Фосфат калия K_3PO_4 образован сильным основанием (KOH) и слабой кислотой (H_3PO_4).

Сульфид натрия Na_2S образован сильным основанием (NaOH) и слабой кислотой (H_2S).

Сульфат цезия Cs_2SO_4 образован сильным основанием (CsOH) и сильной кислотой (H_2SO_4).



С учетом сказанного понятно, что сульфид аммония гидролизуются и по катиону, и по аниону. Фосфат калия гидролизуются по аниону. Сульфид натрия гидролизуются по аниону. Сульфат цезия гидролизу не подвергается.

Ответ: 4331.



В5. Установите соответствие между исходными веществами и основным продуктом их взаимодействия.

| ФОРМУЛЫ ВЕЩЕСТВ | ПРОДУКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ |
|---|------------------------|
| А) $\text{Cr} + \text{Cl}_2$ | 1) CrCl_2 |
| Б) $\text{Cr} + \text{HCl}$ | 2) CrCl_3 |
| В) $\text{CrO}_3 + \text{HCl}$ | 3) CrCl_4 |
| Г) $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{HCl}$ | 4) CrCl_6 |

Решение. При взаимодействии хрома с хлором происходит окисление металла до степени окисления +3, в то время как хлороводород окисляет хром только до степени окисления +2 (вспомните, в точности такая же картина характерна и для железа):



Хром в высшей степени окисления +6 проявляет сильные окислительные свойства. Так, и CrO_3 и $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ окисляют хлороводород до свободного хлора, а сами при этом восстанавливаются до степени окисления +3 (наиболее устойчивой для хрома):



С учетом сказанного не составит труда выбрать правильный ответ.

Ответ: 2122.

В6. Углеводороды образуются в ходе реакции

- 1) карбида кальция с соляной кислотой
- 2) пропена с водородом
- 3) бензола с кислородом
- 4) пропана с водой
- 5) хлоралканов с натрием
- 6) хлоралканов с водным раствором щелочи

Ответ: _____.

Решение. Запишем уравнения возможных реакций (без указания условий проведения):

- 1) $\text{CaC}_2 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{C}_2\text{H}_2$
- 2) $\text{C}_3\text{H}_6 + \text{H}_2 \rightarrow \text{C}_3\text{H}_8$
- 3) $2\text{C}_6\text{H}_6 + 15\text{O}_2 \rightarrow 12\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$
- 4) $\text{C}_3\text{H}_8 + \text{H}_2\text{O}$ реакция не происходит¹
- 5) $2\text{RCl} + 2\text{Na} \rightarrow 2\text{NaCl} + \text{R}-\text{R}$
- 6) $\text{RCl} + \text{OH}^- \rightarrow \text{ROH} + \text{Cl}^-$

А теперь посмотрите, в ходе каких реакций образуются углеводороды (их формулы в уравнениях реакций выделены жирным шрифтом).

Ответ: 125.

В7. Метанол не взаимодействует с

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1) бромоводородом | 4) калием |
| 2) водородом | 5) цинком |
| 3) кислородом | 6) фосфором |

Ответ: _____.

Решение. Спирты не взаимодействуют с водородом, малоактивным цинком, и с фосфором.




Ответ: 256.

В8. Аминоуксусная кислота реагирует с

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1) $\text{Fe}(\text{OH})_2$ | 4) HI |
| 2) Cu | 5) SiO_2 |
| 3) CH_3OH | 6) S |

Ответ: _____.

Решение. Аминоуксусная кислота, будучи амфотерным соединением, может реагировать с гидроксидами металлов (реакция нейтрализации по кислотной группе), с кислотами (реакция нейтрализации по аминогруппе), а также со спиртами (реакция этерификации):



Реакции с медью, оксидом кремния и серой невозможны.

Ответ: 134.

¹ При очень высокой температуре возможна конверсия пропана с водяным паром, в ходе которой образуются CO и H_2 .

В9. При смешивании 200 г 10% –ного раствора сульфата меди и 340 г 16% -ного раствора той же соли получится раствор с массовой долей соли _____. (Запишите число с точностью до целых.)

Решение. Алгоритм решения этой довольно простой задачи может быть таким:

масса соли в первом растворе равна $200 \cdot 0,1 = 20$ г

масса соли во втором растворе равна $340 \cdot 0,16 = 54,4$ г

суммарно масса соли составит $20 + 54,4 = 74,4$ г

масса раствора равна $200 + 340 = 540$ г


массовая доля соли в полученном растворе равна $74,4/540 \cdot 100\% = 13,778\%$

Округлив это число до целых, получим ответ 14%.

Ответ: 14.

В10. Масса хлорида железа (III), которая может получиться при взаимодействии 67,2 л хлора и 100 г железа, равна _____. (Запишите число с точностью до целых.)

Решение. Запишем уравнение реакции:



Найдём количества реагирующих веществ:

$n(\text{Fe}) = 100/56 = 1,79$ моль

$n(\text{Cl}_2) = 67,2/22,4 = 3$ моль

По уравнению реакции. хлора должно быть в полтора раза больше чем железа(т.е. 2,7 моль), следовательно. хлор дан в избытке. расчёт следует вести по железу:

$n(\text{FeCl}_3) = n(\text{Fe}) = 1,79$ моль


$m(\text{FeCl}_3) = n \cdot M = 1,79 \cdot 162,5 = 290,875$ г.

Округлив полученное число до целых, получим 291 г.

Ответ: 291.

Часть 3

С1. Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции



Определите окислитель и восстановитель.

Решение.

| Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) | Баллы |
|---|-------|
| <p>Элементы ответа:</p> <p>1) Составлен электронный баланс:</p> $\begin{array}{l l} 3 & 2\text{I}^{-1} - 2\bar{e} \rightarrow \text{I}_2^0 \\ 1 & 2\text{Cr}^{+6} + 6\bar{e} \rightarrow 2\text{Cr}^{+3} \end{array}$ <p>2) Расставлены коэффициенты в уравнении реакции:</p> $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + 14\text{HI} = 2\text{KI} + 2\text{CrI}_3 + 3\text{I}_2 + 7\text{H}_2\text{O}$ <p>3) Указано, что йод в степени окисления –1 является восстановителем, а хром +6 (или дихромат калия за счет хрома +6) — окислителем.</p> | |

| Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) | Баллы |
|--|-------|
| Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы | 3 |
| В ответе допущена ошибка только в одном из элементов | 2 |
| В ответе допущены ошибки в двух элементах | 1 |
| Все элементы ответа записаны неверно | 0 |
| <i>Максимальный балл</i> | 3 |

- C2. Даны вещества: хлорид алюминия, сода, соляная кислота, гидроксид рубидия. Напишите уравнения четырёх возможных реакций между этими веществами.

Решение.

| Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) | Баллы |
|--|-------|
| <p>Элементы ответа:</p> <p>Приведены четыре уравнения возможных реакций с участием указанных веществ:</p> <p>1) $2\text{AlCl}_3 + 3\text{Na}_2\text{CO}_3 + 3\text{H}_2\text{O} = 2\text{Al}(\text{OH})_3 + 3\text{CO}_2 + 6\text{NaCl}$</p> <p>2) $\text{AlCl}_3 + 3\text{RbOH} = \text{Al}(\text{OH})_3 + 3\text{RbCl}$</p> <p>3) $\text{Na}_2\text{CO}_3 + 2\text{HCl} = 2\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$</p> <p>4) $\text{RbOH} + \text{HCl} = \text{RbCl} + \text{H}_2\text{O}$</p> | |
| Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы | 4 |
| Правильно записаны 3 уравнения реакций | 3 |
| Правильно записаны 2 уравнения реакций | 2 |
| Правильно записано одно уравнение реакции | 1 |
| Все элементы ответа записаны неверно | 0 |
| <i>Максимальный балл</i> | 4 |
| <p>Примечание.</p> <p>Дополнительно записанные (сверх четырёх необходимых) уравнения реакций не оцениваются.</p> | |

- C3. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения:



Решение.

| Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) | Баллы |
|---|-------|
| <p>Элементы ответа:</p> <p>Приведены уравнения реакций, соответствующие схеме превращений:</p> <p>1) $\text{CaCO}_3 + 4\text{C} \xrightarrow{t^\circ} \text{CaC}_2 + 3\text{CO}$</p> | |

| Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) | Баллы |
|---|-------|
| 2) $\text{CaC}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2 + \text{HC}\equiv\text{CH}\uparrow$ 3) $\text{HC}\equiv\text{CH} + 2[\text{Ag(NH}_3)_2]\text{OH} \rightarrow \text{AgC}\equiv\text{CAg}\downarrow + 4\text{NH}_3 + 2\text{H}_2\text{O}$ 4) $\text{AgC}\equiv\text{CAg} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{HC}\equiv\text{CH}\uparrow + 2\text{AgCl}\downarrow$ 5) $2\text{HC}\equiv\text{CH} \xrightarrow{\text{кат.}} \text{H}_2\text{C}=\text{CH}-\text{C}\equiv\text{CH}$ | |
| Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы | 5 |
| Правильно записаны 4 уравнения реакций | 4 |
| Правильно записаны 3 уравнения реакций | 3 |
| Правильно записаны 2 уравнения реакций | 2 |
| Правильно записано одно уравнение реакции | 1 |
| Все элементы ответа записаны неверно | 0 |
| Максимальный балл | 5 |

- С4. Газ, выделившийся при взаимодействии 6,4 г меди с 200 мл 60% -ной азотной кислоты (плотностью 1,4 г/мл), растворили в 200 г 20% -ного раствора гидроксида калия. Рассчитайте массовую долю нитрата калия в полученном растворе.

Решение.

| Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) | Баллы |
|--|-------|
| Элементы ответа: 1) Составлены уравнения реакций: $\text{Cu} + 4\text{HNO}_3 = \text{Cu(NO}_3)_2 + 2\text{NO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ $2\text{NO}_2 + 2\text{KOH} = \text{KNO}_2 + \text{KNO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ 2) Определены количества веществ NO_2 и KOH : $n(\text{Cu}) = 6,4/64 = 0,1$ моль $n(\text{HNO}_3) = 200 \cdot 1,4 \cdot 0,6/63 = 2,67$ моль – в избытке $n(\text{NO}_2) = 2n(\text{Cu}) = 0,2$ моль $n(\text{KOH}) = 200 \cdot 0,2/56 = 0,71$ моль — в избытке 3) Рассчитана масса нитрата калия: $n(\text{KNO}_3) = 0,5n(\text{NO}_2) = 0,1$ моль. $m(\text{KNO}_3) = 0,1 \cdot 101 = 10,1$ г 4) Определена массовая доля нитрата калия в растворе: $m(\text{раствора}) = 200 + 0,2 \cdot 46 = 209,2$ г $\omega(\text{KNO}_3) = 10,1/209,2 = 0,048$ или 4,8% | |
| Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы | 4 |
| В ответе допущена ошибка только в одном из названных выше элементов | 3 |
| В ответе допущены ошибки в двух из названных выше элементов | 2 |
| В ответе допущены ошибки в трёх из названных выше элементов | 1 |
| Все элементы ответа записаны неверно | 0 |
| Максимальный балл | 4 |

5. При взаимодействии предельного альдегида массой 5,8 г с избытком гидроксида меди (II) при нагревании образовалось 14,4 г осадка оксида меди (I). Установите молекулярную формулу альдегида.

Решение.

| Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) | Баллы |
|---|-------|
| <p>Элементы ответа:</p> <p>1). На основании уравнения реакции найдено количество вещества альдегида и рассчитана его молярная масса</p> $C_n H_{2n+1} COH + 2Cu(OH)_2 \rightarrow C_n H_{2n+1} COOH + Cu_2O + 2H_2O$ $n(C_n H_{2n+1} COH) = n(Cu_2O) = 14,4/144 = 0,1 \text{ моль}$ $M = 5,8/0,1 = 58 \text{ г/моль}$ <p>2). Определено число атомов углерода в радикале и установлена формула альдегида:</p> $M(C_n H_{2n+1} COH) = 14n + 30$ $14n + 30 = 58$ $n = 2$ <p>Формула альдегида: C_2H_5COH</p> | |
| Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы | 2 |
| Правильно записан первый элемент ответа | 1 |
| Все элементы ответа записаны неверно | 0 |
| Максимальный балл | 2 |

Медведев Юрий Николаевич

ЕГЭ ХИМИЯ

ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Издательство «ЭКЗАМЕН»

Гигиенический сертификат
№ 77.99.60.953.Д.000454.01.09 от 27.01.2009 г.

Редактор *Н.В. Стрелецкая*
Технический редактор *Н.Я. Богданова*
Корректор *Л.К. Корнилова*
Дизайн обложки *Л.В. Демьянова*
Компьютерная верстка *А.Л. Бабабекова, Т.Н. Меньшова*

105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 1.
www.examen.biz

E-mail: по общим вопросам: info@examen.biz;
по вопросам реализации: sale@examen.biz
тел./факс 641-00-30 (многоканальный)

Общероссийский классификатор продукции
ОК 005-93, том 2; 953005 — книги, брошюры, литература учебная

Качество печати соответствует
качеству предоставленных диапозитивов

По вопросам реализации обращаться по тел.: 641-00-30 (многоканальный).